

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

**This Page Blank (uspto)**

B12

DialogWeb

Guided Search

new search

favorites

settings

order

cost

logoff

help

Targeted Search

Records for: Derwent World Patents

save as alert...

save strategy only...

Output

Format: Full Record

Output as: Browser

display/send

Modify

back to search

back to picklist

select  
all none

Records 1 of 1 In full Format

1. 1/19/1 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011437061 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1997-414968/199738

XRAM Acc No: C97-132788

New 4-substituted piperidin-1-yl carbonyl and piperazin-1-yl carbonyl derivatives - useful in treatment of e.g. depression, obsessive compulsive disorders, anxiety and panic attacks

Patent Assignee: FABRE MEDICAMENT SA PIERRE (FABR )

Inventor: CHOPIN P; HALAZY S; JORAND-LEBRUN C; MARIEN M; PAUWELS P; JORAND L C

Number of Countries: 027 Number of Patents: 008

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
WO 9728141	A1	19970807	WO 97FR203	A	19970203	199738 B
FR 2744449	A1	19970808	FR 961273	A	19960202	199739
AU 9716074	A	19970822	AU 9716074	A	19970203	199801
			WO 97FR203	A	19970203	
EP 880512	A1	19981202	EP 97902427	A	19970203	199901
			WO 97FR203	A	19970203	
BR 9707251	A	19990406	BR 977251	A	19970203	199920
			WO 97FR203	A	19970203	
CN 1214047	A	19990414	CN 97193122	A	19970203	199933
MX 9806255	A1	19981101	MX 986255	A	19980803	200022
JP 2000505795	W	20000516	JP 97527377	A	19970203	200032
			WO 97FR203	A	19970203	

Priority Applications (No Type Date): FR 961273 A 19960202

Cited Patents: EP 524146; EP 533266; EP 533267; EP 533268; EP 606824; GB 2273930; WO 9415920; WO 9504729; WO 9506044; WO 9602525

Patent Details:


Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
WO 9728141	A1	F 132	C07D-295/20	
Designated States (National): AU BR CA CN JP KR MX NZ US				
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE				
FR 2744449	A1	77	C07D-403/12	
AU 9716074	A		C07D-295/20	Based on patent WO 9728141
EP 880512	A1	F	C07D-295/20	Based on patent WO 9728141
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE				
BR 9707251	A		C07D-295/20	Based on patent WO 9728141
CN 1214047	A		C07D-295/20	
MX 9806255	A1		C07D-295/20	
JP 2000505795	W	115	C07D-211/16	Based on patent WO 9728141
Abstract (Basic): WO 9728141 A				
4-Substituted piperidin-1-yl carbonyl and piperazin-1-yl carbonyl				

**This Page Blank (uspto)**

derivatives of formula (I) are new. R<sub>1</sub> = H or 1-6C alkyl; Z<sub>2</sub> = O, NH, CH<sub>2</sub>O or CH<sub>2</sub>NH; R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> = H, alkyl, alkoxy, thioether, nitrile, CF<sub>3</sub> or halo; or R<sub>2</sub>+R<sub>3</sub> when adjacent = 5-6 membered ring; X-Y = NCH<sub>2</sub>, CHCH<sub>2</sub>, C=CH, N or NCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>; Z<sub>1</sub> = e.g. (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CO, CO, SO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CO, OCO, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NHSO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, CH=CHCO, -C triple bond C-O-, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>SO<sub>2</sub> or O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>SO<sub>2</sub>; provided that when X-Y = CHCH<sub>2</sub>, then Z<sub>1</sub> may also be e.g. O, NH, CONH, SO<sub>2</sub>NH, OCONH, NHCOO, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>SO<sub>2</sub>NH, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CONH, NHCO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH or NHSO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH; n = 1-6; and when X-Y = CHCH<sub>2</sub> or C=CH, Z<sub>1</sub> may also be CH=CH or C=C; Ar<sub>1</sub> = Ph, naphthyl or pyridyl (all optionally substituted) or they are substituted on 2 adjacent carbons to form a ring; or Ar<sub>1</sub>-Z<sub>1</sub> = tetrahydronaphthyl linked to X by a saturated carbon; R<sub>4</sub> = 1-6C alkyl; and R<sub>4</sub>' = H or 1-6C alkyl.

USE - (I) are used in the treatment or prevention of depression, obsessive compulsive disorders, anxiety, panic attacks, schizophrenia, aggression, bulimia, alcoholism, pain, neurodegenerative disorders such as Parkinson's or Alzheimer's disease and cancer. (I) may be used in combination with at least one antidepressant, especially Milnacipran and/or a 5HT-1a antagonist (all claimed). (I) are powerful and selective 5HT-1D alpha and beta receptor antagonists. Administration is preferably oral and in a daily dosage of 0.001-1 (preferably 0.005-0.25) g.

Dwg.0/0



Title Terms: NEW; SUBSTITUTE; YL; CARBONYL; YL; CARBONYL; DERIVATIVE; USEFUL; TREAT; DEPRESS; DISORDER; ANXIETY; PANIC; ATTACK

Derwent Class: B02; B03

International Patent Class (Main): C07D-211/16; C07D-295/20; C07D-403/12

International Patent Class (Additional): A61K-031/445; A61K-031/495;

A61K-031/551; A61P-025/16; A61P-025/18; A61P-025/22; A61P-025/24;

A61P-025/28; A61P-025/30; A61P-035/00; C07D-211/22; C07D-211/32;

C07D-211/46; C07D-211/58; C07D-211/62; C07D-211/70; C07D-243/08;

C07D-295/22; C07D-401/12; C07D-295-033; C07D-295-16; C07D-403/12;

C07D-211-16; C07D-211-22; A61K-031-165

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): B07-D11; B07-H; B14-J01A1; B14-J01A3; B14-J01B3;

B14-J01B4; B14-M01A

Chemical Fragment Codes (M2):

\*01\* C316 F011 F012 F013 F014 F019 F431 F432 F433 F523 F553 F560 F599  
G010 G011 G012 G013 G014 G015 G016 G017 G019 G020 G021 G100 G111  
G221 H1 H102 H121 H141 H142 H143 H181 H182 H2 H201 H202 H203 H211  
H212 H341 H521 H541 H542 H543 H598 H599 H600 H601 H602 H608 H641  
H642 H643 H685 H689 H731 J011 J012 J211 J311 J321 J331 J341 J371  
J372 J581 K352 K353 K399 K442 K620 K640 K820 K850 L410 L432 L462  
L463 L499 L640 L941 L943 M123 M125 M126 M131 M132 M135 M136 M137  
M141 M142 M143 M147 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221  
M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M271 M272 M273 M280

**This Page Blank (uspto)**

M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323  
M331 M332 M333 M340 M342 M344 M349 M353 M372 M373 M381 M383 M391  
M392 M393 M413 M510 M522 M523 M531 M532 M540 M630 M640 M650 M710  
M903 M904 P411 P444 P446 P448 P451 P633 9738-21901-N 00347

Ring Index Numbers: ; 00347

Generic Compound Numbers: 9738-21901-N

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2003 Thomson Derwent. All rights reserved.

---

©1997-2003 The Dialog Corporation - Version 2.2

**This Page Blank (uspto)**



B12

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

(11) N° de publication : 2 744 449  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : 96 01273

(51) Int Cl<sup>8</sup> : C 07 D 403/12, C 07 D 401/12, A 61 K 31/445 //  
(C 07 D 403/12, 295:033, 295:16) (C 07 D 401/12, 295:033,  
211:16) (C 07 D 401/12, 295:033, 211:22) (A 61 K 31/445,  
31:165)

(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 02.02.96.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la  
demande : 08.08.97 Bulletin 97/32.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule.*

(60) Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

(71) Demandeur(s) : PIERRE FABRE MEDICAMENT —  
FR.


(72) Inventeur(s) : HALAZY SERGE, JORAND LEBRUN  
CATHERINE, PAUWELS PETER, CHOPIN PHILIPPE  
et MARIEN MARC.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire : REGIMBEAU.

(54) NOUVELLES PIPERAZINES AROMATIQUES DERIVEES DE CYCLOAZANES SUBSTITUES, AINSI QUE LEUR  
PROCEDE DE PREPARATION, LES COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES ET LEUR UTILISATION COMME  
MEDICAMENTS.

(57) La présente invention concerne les composés de for-  
mule (I)



dans laquelle:  
R<sub>1</sub> représente un hydrogène ou un alkyle linéaire ou ra-  
milifié comprenant de 1 à 6 atomes de carbone,  
Z<sub>2</sub> représente O, NH, CH<sub>2</sub>O ou CH<sub>2</sub>NH,  
R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> identiques ou différents représentent un hydro-  
gène ou un groupe choisi parmi un alkyle linéaire ou rami-  
fié, un alcoxy, thioéther, nitrile, trifluorométhyle ou halo-  
gène (F, Cl, Br, I), ou, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> lorsqu'ils sont adjacents,  
pris ensemble, forment un cycle à 5 ou 6 chaînons de façon  
à constituer par exemple un naphyle, un tétrahydronaph-

yle, un benzopyrane ou un benzodioxane,  
X-Y représente NCH<sub>2</sub>, CH-CH<sub>2</sub>, C=CH, N ou NCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>,  
Z<sub>1</sub> représente -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CO-, -CO-, -CO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-,  
SO<sub>2</sub>-, SO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-, -O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-, -O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CO-, -OCO-,  
NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CO-, -NHCO-, -NHCO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-,  
NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>SO<sub>2</sub>-, -NHCO<sub>2</sub>-, NHCO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-, -CH=CHCO-,  
CCCCO-, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>SO<sub>2</sub>-, -O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>SO<sub>2</sub>-.

FR 2 744 449 - A1



La présente invention se rapporte à de nouvelles pipérazines aromatiques dérivées de cycloazanes substitués, ainsi qu'à leur procédé de préparation, les compositions pharmaceutiques les contenant et leur utilisation comme médicaments.

5

La sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT) est un neurotransmetteur et un neuromodulateur impliqué dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques. La sérotonine joue un rôle important tant au niveau du système nerveux qu'au niveau des systèmes  
10 cardiovasculaires et gastro-intestinaux. Au niveau central, la sérotonine contrôle des fonctions aussi variées que le sommeil, la locomotion, la prise de nourriture, l'apprentissage et la mémoire, les modulations endocriniennes, le comportement sexuel, la thermorégulation. Dans la moelle, la sérotonine joue un rôle important dans les systèmes de contrôle des afférentes  
15 nociceptives périphériques (cf. A. Moulignier, Rev. Neurol. (Paris), 150,3-15,1994).

La sérotonine peut jouer un rôle important dans divers types de conditions pathologiques tels que certains désordres psychiatriques (anxiété, dépression, agressivité, attaques de panique, désordres compulsifs  
20 obsessionnels, schizophrénie, tendance au suicide), certains désordres neurodégénératifs (démence de type Alzheimer, Parkinsonisme, chorée de Huntington), l'anorexie, la boulimie, les troubles liés à l'alcoolisme, les accidents vasculaires cérébraux, la douleur, la migraine, ou encore les céphalées diverses (R. Glennon, Neurosci. Biobehavioral Reviews,  
25 14,35,1990).

De nombreuses études pharmacologiques récentes ont mis en évidence la diversité des récepteurs de la sérotonine ainsi que leur implication respective dans ses divers modes d'action (cf. E. Zifa, G. Fillion, Pharm  
Reviews, 44,401, 1992 ; S. Langer, N. Brunello, G. Racagni, J.  
30 Mendelevicz, "Serotonin receptor subtypes: pharmacological significance and clinical implications", Karger Ed. (1992) ; B.E. Leonard, Int. Clin. Psycho-pharmacology, 7,13-21 (1992) ; R.W. Fuller, J. Clin. Psychiatry, 53,36-45 (1992) ; D.G. Grahame-Smith, Int. Clin. Psychopharmacology, 6,

suppl.4, 6-13, (1992). Ces récepteurs sont subdivisés principalement en 4 grandes classes (5HT<sub>1</sub>, 5HT<sub>2</sub>, 5HT<sub>3</sub> et 5HT<sub>4</sub>) qui comportent elles-mêmes des sous-classes telles que les récepteurs 5HT<sub>1</sub> qui sont divisés principalement en 5HT<sub>1A</sub>, 5HT<sub>1B</sub>, 5HT<sub>1D</sub> (cf. G.R. Martin, P.A. Humphrey, *Neuropharmacol.*, **33**,261, 1994 ; P.R. Saxena, *Exp. Opin. Invest. Drugs*, **3**(5), 513, 1994). Les récepteurs 5HT<sub>1D</sub> renferment eux-mêmes plusieurs sous-types de récepteurs ; c'est ainsi que les récepteurs 5HT<sub>1Da</sub> et 5HT<sub>1Db</sub> ont été clonés puis identifiés chez l'homme (cf. par exemple E. Hamel et coll., *Mol. Pharmacol.*, **44**,242, 1993 ; G.W. Rebeck et coll., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **91**,3666, 1994). Par ailleurs, il a été démontré récemment que les récepteurs 5HT<sub>1B</sub> chez les rongeurs et 5HT<sub>1D</sub> chez les autres espèces étaient capables de contrôler la libération de sérotonine dans les terminaisons nerveuses (cf. M. Briley, C. Moret, *Cl. Neuropharm.* **16**,387, 1993 ; B.E. Léonard, *Int. Clin. Psychopharmacol.*, **9**,7, 1994) ainsi que la libération d'autres neurotransmetteurs tels que la norepinéphrine, la dopamine ou l'acétylcholine (M. Harrington, *J. Clin. Psychiatry*, **53**,10, 1992).

Les composés ayant une activité antagoniste sélective au niveau des récepteurs 5HT<sub>1D</sub> centraux tels que les composés nouveaux décrits dans la présente invention peuvent donc exercer un effet bénéfique sur des sujets souffrant de troubles du système nerveux central. En particulier, de tels composés trouvent leur utilité dans le traitement des troubles de la locomotion, de la dépression, de l'anxiété, des attaques de panique, l'agoraphobie, les désordres compulsifs obsessionnels, les désordres de la mémoire incluant la démence, l'amnésie, et les troubles de l'appétit, les dysfonctionnements sexuels, la douleur, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Les antagonistes 5HT<sub>1D</sub> trouvent également leur utilité dans le traitement des désordres endocriniens tels que l'hyperprolactinémie, le traitement des vasospasmes, de l'hypertension et des désordres gastro-intestinaux dans lesquels interviennent des changements au niveau de la motilité et de la sécrétion.


Les composés selon la présente invention sont des antagonistes puissants et sélectifs des récepteurs 5HT<sub>1D</sub> et plus particulièrement des

récepteurs récemment identifiés comme  $5HT_{1D\alpha}$  et  $5HT_{1D\beta}$  chez l'homme et de ce fait trouvent leur utilité, seuls ou en association avec d'autres molécules, comme médicaments et plus particulièrement comme moyens thérapeutiques pour le traitement tant curatif que préventif de désordres liés à la sérotonine.

L'état antérieur de la technique dans ce domaine est illustré notamment par les brevets EP-0533266, EP-0533267 et EP-0533268, GB-2273930, WO-9415920, GB-2276160, GB-2276161, GB-2276162, GB-2276163, GB-2276164, GB-2276165, WO-9504729, WO-9506044, WO-9506637, WO-9511243 et F 9408981 qui décrivent des dérivés aromatiques comme antagonistes  $5HT_{1D}$ , et les publications récentes qui décrivent le GR 127,935 comme antagoniste  $5HT_{1D}$  (cf. M. Skingle et coll., J. of Psychopharm. 8(1),14, 1994 ; S. Starkey, M. Skingle, Neuropharmacol., 33,393, 1994).

Les dérivés de la présente invention se distinguent de l'art antérieur non seulement par leur structure chimique nouvelle qui les distingue sans ambiguïté des dérivés précédemment décrits mais également par leur profil biologique original, en particulier en ce qui concerne leur sélectivité et leur efficacité comme antagonistes au niveau des sous-types de récepteurs de la sérotonine ( $5HT_{1D\alpha}$  et  $\beta$ ).

La présente invention concerne des produits de formule générale (I) :



dans laquelle :

$R_1$  représente un hydrogène ou un alkyle linéaire ou ramifié comprenant de 1 à 6 atomes de carbone,

$Z_2$  représente O, NH,  $CH_2O$  ou  $CH_2NH$ ,

$R_2$  et  $R_3$  identiques ou différents représentent un hydrogène ou un groupe choisi parmi un alkyle linéaire ou ramifié, un alcoxy, thioéther, nitrile, trifluorométhyle ou halogène (F, Cl, Br, I), ou,  $R_2$  et  $R_3$ , lorsqu'ils sont  
5 adjacents, pris ensemble, forment un cycle à 5 ou 6 chaînons façon à constituer par exemple un naphthyle, un tétrahydronaphtyle, un benzopyrane ou un benzodioxane,

$X-Y$  représente  $NCH_2$ ,  $CH-CH_2$ ,  $C=CH$ , N ou  $NCH_2CH_2$ .

$Z_1$  représente  $-(CH_2)_n-$ ,  $-(CH_2)_nCO-$ ,  $-CO-$ ,  $-CO(CH_2)_n-$ ,  $-SO_2-$ ,  
10  $-SO_2(CH_2)_n-$ ,  $-O(CH_2)_n-$ ,  $-O(CH_2)_nCO-$ ,  $-OCO-$ ,  $-NH(CH_2)_n-$ ,  
 $NH(CH_2)_nCO-$ ,  $NHCO-$ ,  $NHCO(CH_2)_n-$ ,  $NH(CH_2)_nSO_2-$ ,  $NHSO_2-$ ,  
 $NHSO_2(CH_2)_n-$ ,  $-CH=CHCO-$ ,  $-CCCO-$ ,  $-(CH_2)_nSO_2-$ ,  $-O(CH_2)_nSO_2-$ .

Dans le cas particulier où  $X-Y$  représente  $CH-CH_2$ ,  $Z_1$  peut également représenter  $-O-$ ,

15  $-NH-$ ,  $-CONH-$ ,  $-SO_2NH-$ ,  $-OCONH-$ ,  $-NHCOO-$ ,  $-NHCONH-$ ,  $-(CH_2)_nNH-$ ,  
 $-(CH_2)_nO-$ ,  $-CO(CH_2)_nNH-$ ,  $-NH(CH_2)_nO-$ ,  $-NH(CH_2)_nNH-$ ,  $-O(CH_2)_nNH-$ ,  
 $-O(CH_2)_nO-$ ,  $-CO(CH_2)_nO-$ ,  $-SO_2(CH_2)_nNH-$ ,  $-SO_2(CH_2)_nO-$ ,  
 $-(CH_2)_nSO_2NH-$ ,  $-(CH_2)_nCONH-$ ,  $-O(CH_2)_nSO_2NH-$ ,  $-O(CH_2)_nCONH-$ ,  
 $NH(CH_2)_nSO_2NH-$ ,  $-NH(CH_2)_nCONH-$ ,  $-NHCO(CH_2)_nNH-$ ,  
20  $NHSO_2(CH_2)_nNH-$  dans lesquels n représente un nombre entier compris entre 1 et 6,

Dans le cas particulier où  $X-Y$  représente  $CH-CH_2$  ou  $C=CH$ ,  $Z_1$  peut également représenter  $-CH=CH-$ ,  $-CC-$ ,


$Ar_1$  représente un reste aromatique (phényl, naphtyl ou pyridyl) pouvant être  
25 diversement substitué par exemple par un ou plusieurs groupes choisis parmi un alkyle linéaire ou ramifié comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, un trifluorométhyle, un trifluorométhoxy, un 2,2,2-trifluoroéthyle, un phényle, un benzyle, un cycloalkyle comprenant de 3 à 7 atomes de carbone, un hydroxyle, un thiol, un alcoxy ( $OR_4$ ), thioéther ( $SR_4$ ), un nitro ( $NO_2$ ), un  
30 nitrile (CN), une amine ( $NH_2$  ou  $NR_4R_4'$ ), un dérivé d'amine ( $NHCOR_4$ ,  $NHSO_2R_4$ ,  $NHCONR_4R_4'$ ,  $NHCO_2R_4$ ,  $NHSO_2NR_4R_4'$ ), un halogène (fluor, chlore, brome ou iode), un carbonyle ( $COH$ ,  $COR_4$ ,  $COOR_4$ ,  $CONR_4R_4'$ ) ou un hétérocycle pouvant éventuellement être substitué tel qu'un hétérocycle à

5 membres pouvant contenir de 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi l'oxygène, le soufre ou l'azote ou par deux substituants sur des carbones voisins pouvant former un cycle avec le reste aromatique auquel ils sont attachés, ou encore, le reste Ar-Z1 représente un tétrahydronaphtyle dont la liaison avec X met en oeuvre un carbone saturé,  
R4 représente un reste alkyle, linéaire ou ramifié, comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, R'4 représente un hydrogène ou un reste alkyle, linéaire ou ramifié, comprenant de 1 à 6 atomes de carbone et leurs sels hydrates, solvates et bioprécurseurs physiologiquement acceptables pour l'usage thérapeutique.

Les isomères géométriques et optiques des composés de formule générale (I) font également partie de la présente invention ainsi que leur mélange sous forme racémique.  
Parmi les sels physiologiquement acceptables des composés de formule générale (I) sont inclus les sels obtenus par addition d'acides organiques ou inorganiques tels que les chlorohydrates, bromhydrates, sulfates, phosphates, benzoates, acétates, naphtoates, p-toluènesulfonates, méthanesulfonates, sulphamates, ascorbates, tartrates, citrates, oxalates, maléates, salicylates, fumarates, succinates, lactates, glutarates, glutaconates.

L'expression "bioprécurseurs" telle qu'elle est utilisée dans la présente invention s'applique à des composés dont la structure diffère de celle des composés de formule (I) mais qui, administrés à un animal ou à un être humain sont convertis dans l'organisme en un composé de formule (I).

Une classe particulièrement appréciée de composés de formule (I) correspond aux composés de formule (Ia)




dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X$ - $Y$ ,  $Z_2$  et  $R_1$  sont définis comme dans la formule I et  $R_2$  représente un radical  $CH_3$ ,  $OCH_3$  ou un chlore.


Les composés de la présente invention peuvent être préparés par différentes méthodes qui seront dépendantes de la nature d' $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X$ ,  $Y$ ,  $Z_2$  et  $R_1$ .

On comprendra que dans certaines réactions ou suites de réactions chimiques qui conduisent à la préparation de composés de formule générale (I) il soit nécessaire ou souhaitable de protéger des groupes sensibles éventuels dans les intermédiaires de synthèse afin d'éviter des réactions secondaires indésirables. Ceci peut être réalisé par l'utilisation (introduction et déprotection) des groupes protecteurs conventionnels tels que ceux décrits dans "Protective groups in Organic Synthesis", T.W. Greene, John Wiley & Sons, 1981 et "Protecting Groups", P.J. Kocienski, Thieme Verlag, 1994. Les groupes protecteurs appropriés seront donc introduits et enlevés lors de l'étape la plus appropriée pour ce faire et en utilisant les méthodes et techniques décrites dans les références citées précédemment.


Les composés de formule générale (I) dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X$ - $Y$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  sont décrits comme précédemment et  $Z_2$  représente  $-CH_2O-$  ou  $-CH_2NH-$  sont préparés par condensation d'un intermédiaire de formule (II) :



dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$  et  $X-Y$  sont définis comme précédemment et  $Y'$  représente un groupe partant tel qu'un halogène (chlore, brome ou iode), un tosylate, un mésylate ou un triflate avec une aryl pipérazine de formule générale (III) :



dans laquelle  $X'$  représente O ou NH et  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  sont décrits comme précédemment. La condensation des arylpipérazines de formule (III) avec les électrophiles de formule (II) est réalisée en présence d'une base organique ou inorganique telle que NaH, KH, DiPEA, DBU, pyridine, DMAP,  $K_2CO_3$ ,  $CaCO_3$ ,  $Cs_2CO_3$ , en présence éventuellement d'un iodure tel que NaI, KI,  $Bu_4NI$ , dans un solvant anhydre polaire tel que le THF, le DME, le n-butanol, le t-butanol, le DMF, le DMSO, la méthyléthylcétone, à une température comprise entre  $20^\circ$  et  $80^\circ$ . Les intermédiaires de formule générale (II) sont aisément préparés par condensation d'une amine cyclique de formule générale (IV)



dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X-Y$  sont définis comme précédemment et un chlorure d'acide de formule générale (V) :




dans laquelle  $Y'$  est décrit comme précédemment en présence d'une base organique ou inorganique telle que la pyridine, la DiPEA, la DMAP, le DBU,  $K_2CO_3$ ,  $Cs_2CO_3$  ou  $CaCO_3$  dans un solvant anhydre aprotique




polaire tel que le THF, le DMF, le DME, le DMSO ou la méthyléthylcétone à une température comprise entre - 10° C et 30° C.

Les intermédiaires de formule générale (III) sont préparés par diverses méthodes et techniques bien connues de l'homme de métier pour la préparation des arylpipérazines et dont le choix est dépendant de la nature de X' et de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>. C'est ainsi que, dans le cas particulier où X' est un oxygène, les intermédiaires de formule (III) sont accessibles par condensation d'une arylamine de formule (VI) :




dans laquelle R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> sont définis comme précédemment avec un dérivé d'amine de formule (VII) :



dans laquelle R<sub>1</sub>' est équivalent à R<sub>1</sub> tel que défini comme précédemment ou R<sub>1</sub>'


représente un groupe protecteur tel qu'un t-butoxycarbonyle ou un tosyle (qui sera transformé en R<sub>1</sub> ultérieurement) et Y représente un chlore, un brome, un iode, un tosylate ou un mésylate. Cette réaction est réalisée préférentiellement dans un solvant anhydre polaire tel que le DMF, l'acétonitrile, le THF, le n-butanol, le t-butanol ou le DMSO, généralement à température de reflux du solvant utilisé, en présence d'une base organique ou inorganique généralement utilisée pour ce type de réaction, telle qu'un carbonate de potassium, de sodium ou de calcium.

Les composés de formule générale (III) dans lesquels X' représente NH sont préparés par condensation d'une amine aromatique de formule générale (X)



5 dans laquelle  $R_2$  et  $R_3$  sont définis comme précédemment et  $X''$  représente une fonction qui pourra ultérieurement être transformée en amine (telle que par exemple un groupe nitro) soit avec un dérivé de bis(halogénoéthyl)amine de formule (VII) dans les conditions décrites précédemment pour ce type de réaction, soit avec un aminoacide de formule

10




15 dans laquelle  $R'_1$  est défini comme précédemment, en présence d'anhydride acétique, suivi de la réduction de la dicétopipérazine intermédiaire ainsi formée avec par exemple un borane. Dans les deux cas, le dérivé de formule (III) sera finalement obtenu après transformation du groupe représenté par  $X''$  en amine. S'il s'agit d'un groupe nitro, cette transformation sera effectuée selon les méthodes et techniques bien connues de l'homme de

20 métier pour transformer un nitroaromatique en un dérivé d'aniline telles que par exemple l'emploi de Nickel de Raney ou de catalyseur au rhodium en présence d'hydrazine, l'hydrogénation sur charbon-palladium à pression atmosphérique, ou encore l'utilisation de  $SnCl_2$  ou de zinc.

25 Les composés de formule générale (I) dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X-Y$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  sont décrits comme précédemment et  $Z_2$  représente O ou NH sont préparés par condensation d'un intermédiaire de formule générale (III) dans laquelle  $X'$  représente O ou NH, et  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  sont définis comme précédemment, et d'une amine cyclique de formule (IV) dans laquelle  $Ar_1$ ,

$Z_1$ , X-Y sont définis comme précédemment, avec un dérivé de formule générale (XII) :



5

dans laquelle  $X_1$  et  $X_2$ , identiques ou différents représentent chacun un groupe partant tel qu'un halogène (en particulier le chlore), un groupe O-alkyle (en particulier le groupe  $\text{OCCl}_3$ ), un groupe succinimyle, phthalyle ou imidazolyle. La méthode de la présente invention comprend également l'utilisation de précurseurs ou analogues bien connus des réactifs de formule générale (XII). C'est ainsi et à titre d'exemple que la condensation des intermédiaires (III) et (IV) avec le phosgène peut être avantageusement effectuée à l'aide de diphosgène ou de triphosgène selon une procédure bien connue de l'homme de l'art.

15

Les méthodes et techniques choisies pour la mise en oeuvre de la préparation des composés de formule (I) dans laquelle  $Z_2$  représente O ou NH par condensation des dérivés de formules (III) dans laquelle  $X'$  représente O ou NH et de dérivés de formule (IV) avec un réactif de formule (XII) telles que le choix de l'ordre des réactifs, les temps de réaction, l'isolation et/ou la purification des intermédiaires, la température de la réaction à différentes étapes de la condensation, la nature du ou des solvants, la présence de co-réactifs (tels qu'une base organique ou inorganique, par exemple une amine tertiaire) ou de catalyseurs et le choix du réactif (XII) (choix de  $X_1$  et  $X_2$ ) seront déterminés par la nature de  $\text{Ar}_1$ ,  $Z_1$ ,  $Z_2$  (O ou NH), X-Y et  $R_1$ .


25

C'est ainsi que, une méthode particulièrement appréciée pour la préparation de dérivés de formule (I) dans laquelle  $Z_2 = \text{NH}$  et  $\text{Ar}_1$ ,  $Z_1$ , X-Y et  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  sont définis comme précédemment, consiste à faire réagir un intermédiaire de formule (III) dans laquelle  $X'$  représente NH avec du triphosgène en présence d'une base telle que la triéthylamine dans un


30

solvant anhydre tel que le dichlorométhane et d'ajouter ensuite un composé de formule (IV) dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$  et  $X-Y$  sont définis comme précédemment en présence d'une base telle qu'une amine tertiaire.

- 5 Dans le cas de la préparation de dérivés de formule générale (I) dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X-Y$  et  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  sont définis comme précédemment et  $Z_2$  représente un oxygène, une méthode particulièrement appréciée consiste à condenser tout d'abord une amine cyclique de formule (IV) avec du triphosgène en présence de triéthylamine dans un solvant anhydre tel que le dichlorométhane et d'isoler l'intermédiaire de formule générale (XIII) ainsi formé :



- 15 avant de le condenser avec un nucléophile de formule générale (III) dans laquelle  $X'$  représente un oxygène, en présence d'une base organique ou inorganique telle que  $NaH$ ,  $KH$ ,  $t-BuOK$  dans un solvant aprotique polaire tel que le THF ou le DMF.
- 20 Doivent également être considérées comme faisant partie de la présente invention les méthodes qui permettent de préparer les produits de formule (I) dans laquelle  $Z_2$  représente  $O$  ou  $NH$  par condensation d'une amine cyclique de formule (IV) avec un dérivé de formule générale (XIV) :




25 dans laquelle  $X_1$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  sont définis comme précédemment et  $Z_2$  représente  $O$  ou  $NH$ , en présence d'une base organique ou inorganique dans

un solvant polaire aprotique à une température comprise entre 20° et 100° C.


Les intermédiaires de formule générale IV dans laquelle Ar<sub>1</sub>, Z<sub>1</sub> et X-Y sont  
5 définis comme précédemment sont préparées d'une manière générale par  
différentes méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art, telles  
que décrites par exemple dans les brevets DE 2801195, EP 7067 (800123),  
EP 12643 (800625), FR 2459795 (810116), EP 372776 (900613), FR  
2678270 (921231), FR 2675801 (921030), EP 580398 (940126), WO  
10 9401403 (940120) ainsi que les publications J. Med. Chem. **34**, 3011,  
(1991); J. Chem. Soc. Chem. Comm. **2**, 142, (1989); Tetrahedron **47**, 5161  
(1991); Synthesis **11**, 1023 (1991); Izobretaniya **37**, 89 (1992) et  
Tetrahedron Lett. **35**, 973, (1994).

15 Une méthode particulièrement appréciée de la préparation des amines  
cycliques de formule (IV), dans le cadre de la présente invention, consiste à  
préparer ces dérivés à partir de précurseurs de formule générale XV.




20 dans laquelle Ar<sub>1</sub>, Z<sub>1</sub> et X-Y sont définis comme précédemment et P  
représente un groupe protecteur habituellement utilisé pour protéger une  
amine secondaire tel que par exemple un benzyle, un benzyle dont  
l'aromatique est substitué, un acétyle, un trifluoroacétyle, un  
25 benzyloxycarbonyle ou un t-butoxycarbonyle. Les méthodes utilisées pour  
transformer le précurseur de formule générale (XV) en amine cyclique IV  
dépendra bien évidemment de la nature de P, et sont décrites dans  
"Protective Groups in Organic Synthesis" T.W. Greene, John Wiley & Sons,  
1981 ou encore "Protecting Group" P.J. Kocienski, Thieme Verlag, 1994. Il  
30 est bien entendu que le choix de la nature du groupe protecteur P sera  
déterminé en fonction des méthodes et techniques mises en oeuvre pour la  
préparation des intermédiaires de formule XV.


Dans le cas particulier où X-Y représente NCH<sub>2</sub>, N ou NCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>, une méthode particulièrement appréciée de préparation des composés de formule XV consiste à condenser un intermédiaire de formule XVI



dans laquelle P représente un groupe protecteur d'une amine tel que décrit précédemment, avec un électrophile de formule XVII



dans laquelle Ar<sub>1</sub> et Z<sub>1</sub> sont définis comme précédemment et L représente un groupe partant. La nature de L et les conditions expérimentales utilisées pour réaliser cette condensation dépendront surtout de la nature de Z<sub>1</sub>. C'est ainsi que, dans le cas où Z<sub>1</sub> représente -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, CO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NHCO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, SO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NHSO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>; cette condensation pourra être réalisée entre un intermédiaire de formule (XVI) et un électrophile de formule XVII dans laquelle L sera choisi parmi Cl, Br, I, OTs, OMs, OTf, en présence d'une base organique (tel que par exemple une amine tertiaire) ou inorganique (tel que par exemple Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ou Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) dans un solvant anhydre polaire tel que le THF, le DME, le DMF ou le DMSO, l'isopropanol ou le t-butanol, à une température comprise entre 0°C et 80°C. Une méthode de préparation alternative mais particulièrement appréciée de ces mêmes dérivés de formule (XV) dans laquelle X représente un azote et Z<sub>1</sub> représente (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, SO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>, NHSO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> ou NHCO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> consiste à condenser une amine cyclique de formule (XVI) dans laquelle X représente un azote avec un aldéhyde de formule XVIII :




dans laquelle  $Ar_1$  est défini comme précédemment et  $Z_2$  représente un reste  $Z_1$  tronqué d'un méthylène, dans les conditions bien connues sous l'appellation "amination reductrice" telles que par exemple celles décrites dans Synlett, 1079, 1995. Dans le cas où  $Z_1$  représente  $(CH_2)_nCO$ ,  $O(CH_2)_nCO$ ,  $NH(CH_2)_nCO$ ,  $CH=CHCO$ ,  $CCCO$ ,  $CO$  ou  $SO_2(CH_2)_nCO$ , la condensation d'une amine cyclique de formule XVI sera effectuée avec un dérivé d'acide carboxylique de formule (XVII) dans laquelle L représente un chlore ou encore l'intermédiaire (XVII) représente une forme activée d'un acide carboxylique propice à la formation d'une amide par réaction avec une amine par les méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art pour ce type de transformation. Dans le cas où  $Z_1$  représente  $NHSO_2$ ,  $SO_2$ ,  $O(CH_2)_nSO_2$ ,  $NH(CH_2)_nSO_2$  ou  $(CH_2)_nSO_2$ , les intermédiaires de formule (XVI) sont condensés avec des chlorures de sulfonyle de formule XVII dans laquelle L représente Cl, par les méthodes bien connues de l'homme de l'art pour préparer une sulfonamide à partir d'un chlorure de sulfonyle et d'une amine.

Dans le cas des composés de formules (XV) dans laquelle  $Ar_1$ , et P sont définis comme précédemment, X représente un azote et  $Z_1$  représente  $OCO$  ou  $NHCO$ , les méthodes de préparation consistent par exemple à condenser soit un phénol ( $Ar_1OH$ ), soit une aniline ( $Ar_1NH_2$ ) et une amine de formule (XVI) avec un réactif de formule XII par les méthodes et techniques décrites précédemment pour la préparation de carbamates et d'urées.


Dans le cas particulier où  $Ar_1Z_1$  représente un tétrahydronaphtyle dont la liaison avec X met en oeuvre un carbone saturé et X représente un azote, une méthode appréciée de préparation d'intermédiaire de formule (XV) consiste à condenser la tétralone appropriée avec une amine cyclique de formule XVI, en présence d'acide p-toluène sulfonique dans un solvant tel que le toluène à reflux, suivi de la réduction de l'énamine ainsi formée par exemple par hydrogénation catalytique sous pression d'hydrogène en présence de palladium ou oxyde de platine sur charbon.

Une méthode particulièrement appréciée de préparation des intermédiaires de formule (XV) dans laquelle X-Y représente  $\text{NCH}_2$ , N ou  $\text{NCH}_2\text{CH}_2$  et  $\text{Z}_1$  représente  $(\text{CH}_2)_n$ ,  $\text{O}(\text{CH}_2)_n$ ,  $\text{NH}(\text{CH}_2)_n$ ,  $\text{SO}_2(\text{CH}_2)_n$  consiste à réduire des amides de formule (XV) dans lesquelles  $\text{Z}_1$  représente respectivement  
 5  $(\text{CH}_2)_{n-1}\text{CO}$ ,  $\text{O}(\text{CH}_2)_{n-1}\text{CO}$ ,  $\text{NH}(\text{CH}_2)_{n-1}\text{CO}$ ,  $\text{SO}_2(\text{CH}_2)_{n-1}\text{CO}$  par les méthodes connues pour permettre de réduire une amide en amine, telles que l'utilisation d'un hydrure d'aluminium (par exemple  $\text{LiAlH}_4$ ) dans un solvant tel que le THF ou l'éther éthylique.

10 Les intermédiaires de formule générale (XV) dans laquelle  $\text{Ar}_1$  et P sont définis comme précédemment et X-Y représente  $\text{C}=\text{CH}$  et  $\text{Z}_1$  représente  $(\text{CH}_2)_n$ ,  $\text{O}(\text{CH}_2)_n$  ou  $\text{CH}=\text{CH}$  sont préparés par couplage d'un organométallique de formules XIX ou XX




20 dans lesquels M représente  $\text{ZnBr}$ ,  $\text{SnR}_3$  où R représente un groupe alkyle tel qu'un butyle ou  $\text{B}(\text{OR}')_2$  où R' représente un hydrogène ou un alkyle et M' représente Zn, avec un triflate vinylique de formule (XXI)



25 en présence d'un dérivé du palladium tel que par exemple  $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ , éventuellement d'une base telle qu'une amine tertiaire, un carbonate de potassium, sodium ou césium, de chlorure de lithium lorsque  $\text{M} = \text{SnR}_3$  et dans un solvant aprotique polaire tel que le THF, le DME ou le DMF à une température comprise entre  $20^\circ$  et  $80^\circ\text{C}$  ( cf "Organometallics in  
 30 synthesis", M. Schlosser, John Wiley & son, 1994). Les triflates intermédiaires de formule XXI sont préparés par exemple par la méthode décrite dans Synthesis, 993, 1991.



Les intermédiaires de formule XV dans laquelle  $Z_1$  représente un reste éthyne et X représente  $C=CH$  sont préparés par couplage de triflates de formule XXI avec un acétylénique aromatique de formule XXII




en présence d'un catalyseur au palladium tel que  $Pd(PPh_3)_4$  ou  $PdCl_2(PPh_3)_2$ , d'une base telle qu'une amine secondaire ou tertiaire, un carbonate de potassium, sodium ou césium et éventuellement d'iodure de cuivre dans un solvant polaire tel que le DMSO, le DMF, le THF (cf Organic Preparation and Procedures int., 27(2), 127-160, 1995).

15 Les intermédiaires de formule générale (XV) dans laquelle  $Ar_1$  et P sont définis comme précédemment, X-Y représente  $CH-CH_2$  et  $Z_1$  représente  $(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_n$  peuvent être préparés à partir des intermédiaires de formule générale (XV) dans laquelle  $Ar_1$  et P sont définis comme précédemment, X-Y représente  $C=CH$  et  $Z_1$  représente  $(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_n$ ,  $CC$  ou  $CH=CH$  par réduction des liaisons doubles et triples par hydrogénation catalytique ( $H_2$ ,  $Pd/C$  par exemple).

20 Les dérivés des formules XV dans laquelle  $Z_1$  représente  $CO$ ,  $(CH_2)_nCO$  ou encore  $O(CH_2)_nCO$  et X-Y représente  $C=CH$ , sont préparés par couplage d'un intermédiaire de formule XIX dans laquelle  $Z_1$  est omis ou représente  $(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_n$  et M représente  $SnR_3$  où R représente un groupe alkyle avec un triflate de formule XXI, en présence d'un catalyseur au palladium tel que  $Pd(PPh_3)_4$  éventuellement de chlorure de lithium et d'une base telle que le carbonate de potassium sous pression de monoxyde de carbone dans un solvant polaire tel que le THF selon la méthode décrite dans "Organometallics in synthesis", M. Schlosser, John Wiley & son, 1994.


30 Les intermédiaires de formule XV dans laquelle  $Z_1$  représente  $CO$  et X-Y représente  $CH-CH_2$  sont préparés par condensation d'un dérivé aromatique " $Ar_1H$ " avec un chlorure d'acide, selon les méthodes et techniques connues

sous le nom de réaction de Friedel-Craft, telles que par exemple décrites dans J. Med. Chem. 33, 903, 1990. Une méthode alternative (dont le choix dépendra essentiellement de la nature de  $Ar_1$ ) de préparation de composés de formule XV dans laquelle  $Z_1$  représente CO et X-Y représente CH-CH<sub>2</sub> consiste à condenser un dérivé organométallique  $Ar_1-M$  dans laquelle M représente MgCl, MgBr ou Li avec un nitrile de formule XXIII




dans un solvant anhydre polaire tel que l'éther éthylique, le THF ou le DME, à une température comprise entre - 20° C et 60° C, suivi de l'hydrolyse acide du milieu réactionnel.

Les intermédiaires de formule générale (XV) dans laquelle  $Z_1$  représente  $(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_n$ ,  $NH(CH_2)_n$ ,  $SO_2(CH_2)_n$  et X-Y représente CH-CH<sub>2</sub> peuvent également être préparés par condensation d'un nucléophile de formule générale XXIV




(dont une méthode de préparation est décrite dans le brevet US 4335127; 1982) avec un dérivé de formule XVII dans laquelle  $Z_1$  représente  $(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_n$ ,  $SO_2(CH_2)_n$  et L est défini comme précédemment.

Dans le cas particulier où  $Z_1$  représente OCO ou NHCO et X-Y représente CH-CH<sub>2</sub> ou C=CH, une méthode appréciée de préparation des intermédiaires de formule (I) consiste à condenser un phénol ( $Ar_1OH$ ) ou une aniline ( $Ar_1NH_2$ ) avec un dérivé de formule XXV




dans laquelle L et le carboxyle auquel il est attaché constituent la forme  
5 activée d'un acide carboxylique propice à la formation d'un amide ou d'un  
ester par condensation avec une amine ou un alcool par les méthodes et  
techniques bien connues de l'homme de l'art.

Dans le cas particulier où  $Z_1$  représente NH et X-Y représente CH-CH<sub>2</sub>, les  
10 intermédiaires de formule XV sont préparés par une réaction d'amination  
réductrice, utilisant par exemple NaBH<sub>4</sub> ou NaBH<sub>3</sub>CN comme agent  
réducteur entre une aniline de formule Ar<sub>1</sub>NH<sub>2</sub> et une pipéridone de formule  
XXVI



dans laquelle P est défini comme précédemment.

Dans les cas particuliers où X-Y représente CH-CH<sub>2</sub> et  $Z_1$  représente  
20 CONH, SO<sub>2</sub>NH, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH, CO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH ou O(CH<sub>2</sub>)NH, les  
intermédiaires de formule XV sont préparés par condensation d'une amino  
piperidine de formule XXVII




avec un électrophile de formule XXVIII



dans laquelle  $Z_1$  représente  $Z_1$  tronqué du reste NH terminal et L est défini comme précédemment. Cette condensation sera effectuée par différentes techniques et méthodes qui dépendront de la nature de  $Z_1$  et L et qui sont similaires aux techniques et méthodes précédemment décrites pour la condensation des intermédiaires XVI et XVII (dans lequel X représente un azote). La réaction d'amination réductrice telle que décrite précédemment peut également être mise en oeuvre pour la préparation de composés de formule XV dans laquelle  $Z_1$  représente  $(CH_2)_n NH$ ,  $O(CH_2)_n NH$  ou  $SO_2(CH_2)_n NH$  à partir des amines de formule XXVII et d'aldéhyde respectivement de formules  $Ar_1(CH_2)_{n-1}CHO$ ,  $Ar_1O(CH_2)_{n-1}CHO$  ou  $SO_2(CH_2)_{n-1}CHO$  ou à partir d'amines de formule  $Ar_1(CH_2)_n NH_2$ ,  $Ar_1O(CH_2)_n NH_2$  ou  $Ar_1SO_2(CH_2)_n NH_2$  avec la pipéridone XXVI.

Les intermédiaires de formule XV dans laquelle  $Z_1$  représente  $OCONH$  ou  $NHCONH$  et X-Y représente  $CH-CH_2$  sont préparés par condensation d'une aminopiperidine de formule XXVII et d'un phénol ( $Ar_1OH$ ) ou d'une aniline ( $Ar_1NH_2$ ) avec un électrophile de formule XII selon les méthodes et techniques décrites précédemment pour la préparation de carbamates ou d'urées.

Dans le cas particulier où  $Z_1$  représente O et X-Y représente  $CH-CH_2$ , les intermédiaires de formule XV sont préparés par une réaction de Mitsunobu à partir d'un dérivé  $Ar_1OH$  et d'un dérivé hydroxylé de pipéridine de formule (XXIX)



dans laquelle P est défini comme précédemment.

Dans le cas particulier où X-Y représente  $CH-CH_2$  et  $Z_1$  représente  $(CH_2)_n O$ ,  $O(CH_2)_n O$ ,  $NH(CH_2)_n O$ ,  $CO(CH_2)_n O$  ou  $SO_2(CH_2)_n O$ , les intermédiaires de formule XV sont préparés par condensation d'une hydroxy pipéridine de formule (XXIX) avec un électrophile de formule (XXVIII)

dans lequel  $Z_1$  représente  $Z_1$  tronqué d'un oxygène terminal et L représente un groupe partant tel qu'un halogène (chlore, brome ou iode), un tosylate, un mésylate ou un triflate. Cette condensation peut être réalisée en présence d'une base, organique (telle qu'une amine tertiaire, le t-butylate de potassium ou encore le butyllithium) ou inorganique (par exemple, NaH, KH,  $Cs_2CO_3$ ) dans un solvant anhydre polaire tel que le THF, le DME, le DMF, le DMSO, le t-butanol, à une température comprise entre  $-15^\circ C$  et  $80^\circ C$ .

10 Les intermédiaires de formule XV dans laquelle  $Z_1$  représente  $NHCOO$  et X-Y représente  $CH-CH_2$  sont préparés par condensation d'un alcool de formule (XXIX) et d'un dérivé d'aniline ( $Ar_1NH_2$ ) avec un réactif de formule XII selon les méthodes et techniques décrites précédemment pour la préparation d'un carbamate.


15 Les intermédiaires de formule XV dans lesquels  $Z_1$  représente  $NHSO_2$ ,  $SO_2$ ,  $(CH_2)_nSO_2$ ,  $O(CH_2)_nSO_2$  ou  $NH(CH_2)_nSO_2$  et X-Y représente  $CH-CH_2$  sont préparés par condensation d'un chlorure de sulfonyle répondant à la formule XXX.

20



25 avec un nucléophile de formule XXIV dans un solvant aprotique polaire tel que l'éther éthylique ou le THF à une température comprise entre  $0^\circ$  et  $60^\circ C$ .

Doivent être également considérées comme faisant partie de la présente invention, des méthodes de synthèse alternatives des composés de formule (I) dans laquelle X-Y représente  $NCH_2$ , N,  $NCH_2CH_2$  qui consistent à  
30 condenser des intermédiaires de formule générale (XXXI)



dans laquelle  $Z_2$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  sont définis comme précédemment avec un électrophile de formule (XVII) dans laquelle  $Z_1$  et  $L$  sont définis comme précédemment et ceci, selon les méthodes et techniques décrites précédemment pour la condensation de XVI avec XVII et dont le choix dépendra essentiellement de la nature de  $Z_1$ .

Dans le cas particulier des composés de formule (I) avec  $X = N$  et  $Z_1 = OCO$  ou  $NHCO$ , une méthode alternative de préparation consiste à faire réagir un phénol de formule  $Ar_1OH$  ou une amine de formule  $Ar_1NH_2$  et une amine de formule (XXXI) définie comme précédemment avec un composé de formule (XII) par les méthodes et techniques décrites précédemment pour la préparation de carbamates et d'urées.

Dans le cas particulier des composés de formule générale (I) dans laquelle  $R_1$  représente un hydrogène, il est préférable de mettre en oeuvre, pour certaines réactions qui le nécessitent, des intermédiaires réactionnels dans lesquels  $R_1$  représente un groupe protecteur tel que par exemple un t-butoxycarbonyl (BOC) qui sera introduit préalablement par condensation de l'intermédiaire approprié dans lequel  $R_1 = H$  avec un réactif adéquat tel que  $(BOC)_2O$ ,  $BOC-ON = C(CN)-Ph$ ,  $BOC-ONH_2$ . Ceci permettra de préparer, selon les méthodes et techniques présentées préalablement, des intermédiaires de formule générale (I) dans lesquels  $R_1 = BOC$  et de transformer ces intermédiaires en produits finaux de formule générale (I) dans lequel  $R_1 = H$  après déprotection du t-butoxycarbonyl selon les méthodes et techniques bien connues pour ce type de transformation telle que l'utilisation d'acide ( $HCl$ ,  $CF_3CO_2H$ ,  $H_2SO_4$ ) en milieu organique.

Doivent également être considérées comme faisant partie intégrale de la présente invention toutes les méthodes qui permettent de transformer un

dérivé de formule (I) en un autre dérivé de formule (I) dans laquelle au moins un des substituants  $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X-Y$ ,  $Z_2$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  ou  $R_3$  sont différents, par les méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art. C'est ainsi, et à titre d'exemple, que les dérivés de formule générale (I) dans  
5 les quels  $Ar_1$  représente un phényle substitué par un groupe  $NO_2$  peuvent être transformés en dérivés de formule (I) dans lesquels  $Ar_1$  représente un phényle substitué en même position par un groupe  $NH_2$  par les méthodes et techniques bien connues pour ce type de réduction telles que décrites par exemple dans "Comprehensive Organic Transformation", p. 412 ; R. C.  
10 Larock, VCH, 1989, parmi lesquelles on peut citer l'hydrogénation atmosphérique catalysée au palladium sur charbon, l'utilisation du  $SnCl_2$ , de zinc, de Ni de Raney ou encore de catalyseur au rhodium en présence d'hydrazine. Les composés de formule générale (I) dans lesquels  $Ar_1$  représente un aromatique substitué par un groupement  $NH_2$  peuvent eux  
15 aussi être transformés en de nombreux autres dérivés de formule (I) tels que des dérivés dans lesquels  $Ar_1$  représente un aromatique substitué par  $NR_4R_4'$ ,  $NHCOR_4$ ,  $NHCO_2R_4$ ,  $NHCOR_4$ ,  $NHSO_2R_4$ ,  $NHSO_2OR_4$ ,  $NHSO_2NR_4R_4'$  par les méthodes et techniques bien connues pour transformer une amine aromatique en amide, carbonate, urée, sulfonamide,  
20 sulfonate ou sulfonylurée.

Lorsque l'on désire isoler un composé selon l'invention à l'état de sel, par exemple de sel par addition avec un acide, on peut y parvenir en traitant la base libre de formule générale (I) par un acide approprié de préférence en  
25 quantité équivalente, ou par le sulfate de créatinine dans un solvant approprié.

Lorsque les procédés décrits ci-dessus pour préparer les composés de l'invention donnent des mélanges de stéréoisomères, ces isomères peuvent  
30 être séparés par des méthodes conventionnelles telles que la chromatographie préparative.

Lorsque les nouveaux composés de formule générale (I) possèdent un ou plusieurs centres asymétriques, ils peuvent être préparés sous forme de mélange racémique ou sous forme d'énantiomères que ce soit par synthèse énantiosélective ou par résolution. Les composés de formule (I) possédant au moins un centre asymétrique peuvent par exemple être séparés en leurs énantiomères par les techniques habituelles telles que la formation de paires diastéréomériques par formation d'un sel avec un acide optiquement actif tel que l'acide (+)-di-*p*-toluoyl-l-tartrique, l'acide (+)-camphorsulfonique, l'acide (-)-camphorsulfonique, l'acide (+)-phénylpropionique, l'acide (-)-phénylpropionique, suivie par cristallisation fractionnée et régénération de la base libre. Les composés de formule (I) dans lesquels R<sub>1</sub> est un hydrogène comprenant au moins un centre asymétrique peuvent également être résolus par formation d'amides diastéréomériques qui sont séparés par chromatographie et hydrolysés pour libérer l'auxiliaire chiral.

Les exemples qui suivent illustrent l'invention sans toutefois en limiter la portée.

Les spectres RMN du proton ont été enregistrés sur un appareil Brücker AC 200. Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm et les abréviations suivantes ont été utilisées : "s" pour singulet; "se" pour singulet élargi, "d" pour doublet, "dd" pour doublet de doublet, "t" pour triplet, "q" pour quadruplet, "sx" pour sextuplet, "m" pour multiplet, "M" pour massif.


Les spectres infrarouge ont été enregistrés sur un appareil Nicolet 510P. Les bandes d'absorption sont données en cm<sup>-1</sup>.

Les analyses élémentaires ont été réalisées sur un appareil Fisons EA 1108.



**EXEMPLE 1**

Difumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-phénéthylpipérazin-1-ylamide



Une solution de 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline pouvant être préparée selon la méthode décrite dans le brevet européen 0533266-11 (500mg, 2.26mmol) et de triéthylamine (315µl, 2.27mmol) dans le dichlorométhane (10ml) est cannulée lentement sur une solution de triphosgène (225mg, 0.76mmol) dans le dichlorométhane (30ml) sous atmosphère d'azote. Pendant cette opération, le mélange réactionnel est refroidi avec un bain de glace. Il est ensuite ramené à température ambiante pendant 20mn avant l'ajout de la 4-phénéthylpipérazine (430mg, 2.26mmol) et la triéthylamine (315µl, 2.27mmol) diluées dans le dichlorométhane (10ml). Après 2 h à température ambiante, le mélange est dilué avec de l'eau puis extrait trois fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont rassemblées, lavées une fois avec une solution saturée en chlorure de sodium, séchées sur sulfate de magnésium et concentrées. Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 831mg (Rdt : 84%)

Ce composé est dissous dans le méthanol et traité avec de l'acide fumarique pour donner le fumarate correspondant. Celui-ci est cristallisé dans l'éther.

Analyse Élémentaire pour:  $C_{25}H_{35}N_5O_2 \cdot 2C_4H_4O_4$

Calculées: C 59.18 ; H 6.47 ; N 10.46 ; Expérimentales: C 58.75 ; H 6.53 ; N 10.40

Masse : 438 (MH<sup>+</sup>), 248, 191, 136


IR (KBr): 3400,3028,1707,1639,1508

RMN 1H (DMSO) : 2.42-2.48 (m,9H); 2.74 (M,6H); 3.00 (M,4H); 3.35 (M,4H); 3.71 (s,3H); 6.57 (s,4H); 6.79 (d,1H); 7.09-7.31 (m,7H); 8.29 (s,1H).

Point de fusion : 120°C

### EXEMPLE 2

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(2,4,6-triméthylbenzylcarbonyl)pipérazin-1-ylamide



**Composé 2a** : 1-(2,4,6-triméthylbenzylcarbonyl)-4-(*tert*-butyloxycarbonyl) pipérazine

Une solution de *tert*-butyloxycarbonylpipérazine (1.05 g, 5.61 mmol) et d'acide mésitylacétique (1.0g, 5.61mmol) dans le dichlorométhane (50ml) est agitée pendant trois jours à température ambiante en présence du chlorhydrate de la 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide (1.08g, 5.61mmol), de triéthylamine (800ml, 5.61mmol) et de 4-diméthylaminopyridine (une pointe de spatule). Après dilution dans l'eau, le mélange est extrait trois fois à l'acétate d'éthyle, puis les phases organiques rassemblées sont lavées avec une solution saturée en chlorure de sodium, séchées sur sulfate de

magnésium, filtrées et concentrées. Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

5 *Masse obtenue* : 1.7g (Rdt : 88%)

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) : 1.45 (s,9H); 2.18 (s,6H); 2.23 (s,3H); 3.43 (M,4H); 3.56 (M,4H); 3.61 (s,2H); 6.83 (s,2H).

10 **Composé 2h**: 1-(2,4,6-triméthylbenzylcarbonyl)pipérazine

L'acide trifluoroacétique (4.9ml) est additionné lentement à une solution du composé 2a (1.7g;4.91mmol) dans le dichlorométhane (25ml) maintenue à 0°C. Le mélange réactionnel est ensuite ramené à  
15 température ambiante et la réaction est suivie par chromatographie sur couche mince. Après 1 h, la réaction est complétée. L'acide trifluoroacétique est neutralisé avec une solution saturée en hydrogénocarbonate de sodium. Les phases sont séparées et la phase organique est lavée avec une solution saturée en chlorure de sodium  
20 séchée sur sulfate de magnésium et concentrée. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/10/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 1.08 g (Rdt : 89 %)

25

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) : 1.25 (se,1H); 2.22 (s,6H); 2.25 (s,3H); 2.86 (M,4H); 3.61 (M,6H); 6.85 (s,2H).

**Composé 2** : Le composé 2 est préparé suivant la procédure décrite  
30 dans l'exemple 1 à partir des réactifs suivants : triphosgène (204mg,0.69mmol) ; 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (555mg,2.06mmol) ; triéthylamine (290µl x 2, 2.06mmol x 2) ; 1-(2,4,6-

triméthylbenzylcarbonyl)pipérazine (2b) (506mg, 2.06mmol) ;  
dichlorométhane (40ml).

Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (92/8/1)  
puis (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 756 mg (Rdt : 75 %)

Ce composé est dissous dans le méthanol et traité avec de l'acide  
fumarique pour donner le fumarate correspondant. Celui-ci est  
cristallisé dans l'éther.

Analyse Élémentaire pour:  $C_{28}H_{39}N_5O_3 \cdot C_4H_4O_4$

Calculées: C 63.04 ; H 7.11 ; N 11.49 ; Expérimentales: C 62.91 ; H  
7.46 ; N 11.12

Masse (DCI/NH<sub>3</sub>) : 494 (MH<sup>+</sup>), 248, 222


IR (KBr): 3440, 3315, 3012, 2907, 2861, 1637, 1512, 1439, 1222

RMN 1H (DMSO) : 2.10 (s, 6H); 2.18 (s, 3H); 2.32 (s, 3H); 2.62 (M, 4H);  
2.97 (M, 4H); 3.47 (M, 8H); 3.65 (s, 2H); 3.71 (s, 3H); 6.55 (s, 2H); 6.80  
(m, 3H); 7.04 (m, 2H); 8.37 (s, 1H).

Point de fusion : 197°C

### EXEMPLE 3

Difumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-  
(2,4,6-triméthylphénéthyl)pipérazin-1-ylamide



**Composé 3a : 1-(2,4,6-triméthylphénéthyl)pipérazine**

A une suspension du composé 2b (551mg, 2.24mmol) dans l'éther  
éthylque (10ml) est ajoutée lentement une solution d'hydrure de  
lithium et d'aluminium ( 3.4ml d'une solution 1M dans l'éther  
éthylque, 3.4mmol). Après 1/2h, le mélange réactionnel est neutralisé  
lentement par une solution 3M de soude puis filtré sur Célite. Les  
phases sont séparées et la phase organique est séchée sur sulfate de  
magnésium, filtrée et concentrée. Le brut est purifié par  
chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de  
dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 413mg (Rdt : 79%)

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) : 1.67 (s, 1H); 2.25 (s, 3H); 2.31 (s, 6H); 2.36-2.45  
(m, 2H); 2.55 (M, 4H); 2.78-2.87 (m, 2H) ; 2.96 (t, 4.9Hz, 4H); 6.84  
(s, 2H).

**Composé 3** : Le composé 3 est préparé suivant la procédure décrite  
dans l'exemple 1 à partir des réactifs suivants : triphosgène  
(172mg, 0.58mmol) ; 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline  
(384mg, 1.74mmol) ; triéthylamine (244μl x 2, 1.74mmol x 2); 1-(2,4,6-  
triméthylphénéthyl)pipérazine (3a) (403mg, 1.74mmol) ;  
dichlorométhane (40ml).

Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (92/8/1)  
puis (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 792 mg (Rdt : 95 %)

Ce composé est dissous dans le méthanol et traité avec de l'acide  
fumérique pour donner le fumarate correspondant. Celui-ci est  
cristallisé dans l'éther.

Analyse Elémentaire pour:  $C_{28}H_{41}N_5O_2 \cdot 2C_4H_4O_4 \cdot 0.64H_2O \cdot 0.5C_4H_{10}O$

Calculées: C 60.02 ; H 7.33 ; N 9.21 ; Expérimentales: C 59.87 ; H 7.26 ; N 9.18

Masse (DCI/NH<sub>3</sub>) : 480(MH<sup>+</sup>), 248, 233, 136


IR (KBr) : 3440, 2914, 1683, 1643, 1512, 1262, 985

RMN <sup>1</sup>H (DMSO) : 2.16 (s, 3H); 2.23 -s, 6H); 2.40 (M, 5H); 2.49 (M, 4H); 2.74 (M, 6H); 3.00 (M, 4H); 3.45 (M, 4H); 3.72 (s, 3H); 6.58 (s, 4H); 6.80 (m, 3H); 7.05 (m, 2H); 8.29 (s, 1H).

Point de fusion : 103°C

#### EXEMPLE 4

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(2-trifluorométhylphénéthyl)pipérazin-1-ylamide



**Composé 4a** : 1-(2-trifluorométhylbenzylcarbonyl)-4-(tert-butyloxycarbonyl) pipérazine

Le composé 4a est préparé suivant la même procédure que celle décrite pour le composé 2a à partir des réactifs suivants : acide (2-trifluorométhylphényl)acétique (1.14g, 5.56mmol); 1-tert-butyloxycarbonylpipérazine (1.04g, 5.56mmol); chlorhydrate de la 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide (1.07g, 5.56mmol); 4-diméthylaminopyridine (une pointe de spatule); dichlorométhane (50ml). Le brut est engagé directement dans l'étape suivante.

*Masse obtenue* : 1.92g (Rdt : 93%)

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.43 (s,9H); 3.40 (M,6H); 3.62 (M,2H); 3.86 (s,2H); 7.35 (te,7.5Hz,2H); 7.50 (d,7.6Hz,1H); 7.63 (d,7.5Hz,1H).

**Composé 4b: 1-(2-trifluorométhylbenzylcarbonyl)pipérazine**

Le composé 4b est préparé suivant la même procédure que celle décrite pour le composé 2b à partir des réactifs suivants : composé 4a (1.92g,5.15mmol); acide trifluoroacétique (4.7ml),dichlorométhane (25ml). Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 866 mg (Rdt : 62%)

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 2.75-2.88 (m,4H); 3.41 (t,4.4Hz,2H); 3.64 (t,4.9Hz,2H); 3.87 (s,2H); 7.36 (M,2H); 7.50 (d,7.4Hz,1H); 7.65 (de,8.9Hz,1H).

**Composé 4c: 1-(2-trifluorométhylphénéthyl)pipérazine**

Le composé 4c est préparé suivant la même procédure que celle décrite pour le composé 3a à partir des réactifs suivants : composé 4b (866mg,3.18mmol); hydrure de lithium et d'aluminium (4.8ml d'une solution 1M dans l'éther éthylique,4.8mmol); éther éthylique (15ml). Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 385mg (Rdt : 45%)

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.84 (se,1H); 2.53 (M,6H); 2.92 (M,6H); 7.24-7.62 (m,4H).

**Composé 4 :** Le composé 4 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : triphosgène (150mg, 0.50mmol) ; 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (310mg, 1.19mmol) ; pyridine (130µl x 2, 1.64mmol x 2) ; 1-(2-trifluorométhylphénéthyl)pipérazine (4c) (385mg, 1.19mmol) ;  
5 dichlorométhane (40ml).

Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (80/20/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

10 *Masse obtenue :* 423 mg (Rdt : 70 %)

Ce composé est dissous dans le méthanol et traité avec de l'acide fumarique pour donner le fumarate correspondant. Celui-ci est cristallisé dans l'éther.

15

*Analyse Élémentaire pour:*  $C_{26}H_{34}F_3N_5O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot 0.55H_2O$

*Calculées:* C 57.05 ; H 6.24 ; N 11.09 ; *Expérimentales:* C 56.92 ; H 6.35 ; N 10.80

20

*IR (KBr) :* 3422, 2952, 2838, 1642, 1508


*RMN <sup>1</sup>H (DMSO) :* 2.40 (s, 3H); 2.51 (M, 6H); 2.72 (M, 4H); 3.01 (M, 6H); 3.45 (M, 4H); 3.74 (s, 3H); 6.59 (s, 2H); 6.81 (d, 8.7Hz, 1H); 7.08 (m, 2H); 7.40-7.72 (m, 4H); 8.31 (s, 1H).  
25

*Point de fusion :* 124°C



**EXEMPLE 5**

Fumarate du 4-(2-méthylbenzylcarbonyl)pipérazin-1-yloate de [4-chloro-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)]phényle



5

**Composé 5a : 1-(2-méthylbenzylcarbonyl)-4-(*tert*-butyloxycarbonyl)pipérazine**

- 10 Le composé 5a est préparé suivant la même procédure que celle décrite pour le composé 2a à partir des réactifs suivants : acide *o*-tolylacétique (500mg, 3.3mmol); 1-*tert*-butyloxycarbonylpipérazine (620mg, 3.3mmol); chlorhydrate de la 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide (688mg, 3.3mmol); triéthylamine (460ml, 3.3mmol);
- 15 4-diméthylaminopyridine (une pointe de spatule); dichlorométhane (30ml). Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (100/0/1) puis (95/5/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 803mg (Rdt : 76%)

20

Analyse Élémentaire pour: C<sub>18</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Calculées: C 67.90 ; H 8.23 ; N 8.80 ; Expérimentales: C 67.49 ; H 8.21 ; N 8.74

25 IR (KBr) : 2972, 2913, 1701, 1636

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>) : 1.42 (s, 9H); 2.25 (s, 3H); 3.36 (M, 6H); 3.60 (M, 2H); 3.73 (s, 2H); 7.05-7.15 (m, 4H).

**Composé 5b: 1-(2-méthylbenzylcarbonyl)pipérazine**

Le composé 5b est préparé suivant la même procédure que celle décrite pour le composé 2b à partir des réactifs suivants : composé 5a (765mg, 2.4mmol); acide trifluoroacétique (2.2ml), dichlorométhane (12ml). Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 436 mg (Rdt : 83%)

Analyse Élémentaire pour:  $C_{13}H_{18}N_2O$

Calculées: C 69.80 ; H 8.38 ; N 12.52 ; Expérimentales: C 69.93 ; H 8.44 ; N 12.44

RMN  $^1H$  ( $CDCl_3$ ) : 2.26 (s, 3H); 2.71 (t, 4.8Hz, 2H); 2.83 (t, 5.1Hz, 2H); 3.37 (t, 5.0Hz, 2H); 3.64 (t, 5.1Hz, 2H); 3.66 (s, 2H); 4.75 (s, 1H); 7.14 (m, 4H).

**Composé 5c : 1-chlorocarbonyl-4-(2-méthylbenzylcarbonyl)pipérazine**

Une solution du composé 5b (300mg, 1.37mmol) et de pyridine (110ml, 1.37mmol) dans le dichlorométhane (10ml) est cannulée lentement sur une solution de triphosgène (136mg, 0.46mmol) dans le dichlorométhane (10ml) maintenue à 0°C. Le mélange est ensuite ramené à température ambiante et laissé 1/2h avant d'être dilué avec de l'eau. La phase organique est alors lavée avec une solution saturée en chlorure de sodium, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée. Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (40/60) d'éther de pétrole/acétate d'éthyle.

Masse obtenue : 261 mg (Rdt : 67%)

IR (KBr) : 2923,2890,1721,1643

RMN  $^1\text{H}$  ( $\text{CDCl}_3$ ) : 2.26 (s,3H); 3.45-3.71 (M,8H); 3.68 (s,2H); 7.12 (m,4H).

5

**Composé 5 :** Une solution de 4-chloro-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phénol préparé suivant la méthode décrite dans le brevet français n° 9408981 (211mg,0.93mmol) dans le tétrahydrofurane (4ml) est cannulée sur une suspension d'hydru de sodium  
10 (50%,49mg,1.02mmol) dans le tétrahydrofurane (10ml) maintenue à 0°C. Le mélange réactionnel est ensuite ramené à température ambiante et agité pendant 20mn. Après ce temps, une solution du composé 5c (261mg,0.93mmol) est additionnée et le mélange est agité pendant  
15 encore 1h. Il est dilué avec de l'eau et extrait trois fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques réunies sont lavées avec une solution saturée en chlorure de sodium, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

20 **Masse obtenue :** 394 mg (Rdt : 90 %)

Ce composé est dissous dans le méthanol et traité avec de l'acide fumarique pour donner le fumarate correspondant. Celui-ci est cristallisé dans l'éther.

25

**Analyse Élémentaire pour:**  $\text{C}_{25}\text{H}_{31}\text{ClN}_4\text{O}_3\text{-C}_4\text{H}_4\text{O}_4$

**Calculées:** C 59.33 ; H 6.01 ; N 9.54 ; **Expérimentales:** C 59.43 ; H 6.05 ; N 9.56

30

**Masse (DCI/ $\text{NH}_3$ ) :** 471(MH+),437,339,219,136


IR (KBr) : 3450,3009,2927,2853,1698,1646,1428,1242

RMN  $^1\text{H}$  (DMSO) : 2.21 (s,3H); 2.33 (s,3H); 2.63 (M,4H); 3.01 (M,4H); 3.45 (M,2H); 3.60 (M,6H); 3.74 (s,2H); 6.60 (s,2H); 6.85 (dd, 2.7 et 8.7 Hz,1H); 6.95 (d,2.6 Hz,1H); 7.07-7.16 (m,4H); 7.41 (d,8.6 Hz,1H).

Point de fusion : 189°C

#### EXEMPLE 6

Hémifumarate du 4-(4-nitrophénéthyl)pipérazin-1-yloate de [4-chloro-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)]phényle



#### Composé 6a : 1-(4-nitrophénéthyl)pipérazine

Une solution de bromure de 4-nitrophénéthyle (1.58g;6.52mmol) est agitée pendant deux heures à température ambiante en présence de pipérazine (2.81g; 32.6mmol) et de carbonate de césium (3.19g;9.8mmol) dans le DMF (60ml) . Le mélange réactionnel est ensuite concentré, puis repris dans l'eau et extrait trois fois à l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont réunies, lavées avec une solution saturée en chlorure de sodium, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un gradient de (95/5/1) à (85/15/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque

Masse obtenue : 1.046 g (Rdt : 68 %)

Analyse Élémentaire pour:  $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_2$

*Calculées*: C 61.26 ; H 7.28 ; N 17.86 ; *Expérimentales*: C 61.10 ; H 7.27 ; N 17.53.

*IR (KBr)* : 3266,2950,2815,1516,1344

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.85 (s, 1H), 2.47 (m, 4H), 2.56 (m, 2H), 2.87 (m, 6H, ), 7.33 (d, 8.6Hz, 2H), 8.11 (d, 8.7Hz, 2H).

**Composé 6b : 1-chlorocarbonyl-4-(*p*-nitrophénéthyl)pipérazine**

Le composé 6b est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 5c à partir des produits suivants : 1-(4-nitrophénéthyl)pipérazine (397mg,1.69 mmol), triphosgène (168 mg,0.57 mmol), pyridine (137ml,1.69mmol), dichlorométhane (30ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (100/1) de dichlorométhane/ammoniaque puis (95/5/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque .

*Masse obtenue* : 216mg (Rdt : 43%)

*IR (KBr)* : 2940,2810,1730,1508,1340

*Masse* : 298 (MH<sup>+</sup>).

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 2.57 (M, 4H), 2.69 (t,7.4Hz, 2H), 2.93 (t,7.4Hz,2H), 3.67 (M, 2H), 3.76 (M, 2H), 7.37 (d,8.6Hz, 2H, ), 8.16 (d,8.6Hz, 2H).

**Composé 6 :**

Le composé 6 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 5 à partir des réactifs suivants : 4-chloro-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phénol (148 mg,0.66 mmol), composé 6b (195mg,0.66mmol), hydrure de sodium (50%, 34.6mg,0.72mmol), THF (17ml). Le brut

réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 273 mg (Rdt : 85%).

5

*Analyse élémentaire* pour  $C_{24}H_{30}ClN_5O_4 \cdot 0.5C_4H_4O_4 \cdot 0.2H_2O$   
calculée C 56.78 H 5.94 N 12.73 Cl 6.45 ; expérimentale C 56.79 H 5.89 N 12.28 Cl 6.22.

10 *Masse* (DCI/ $NH_3$ ) : 488 ( $MH^+$ ).

*IR* (KBr) : 2924, 2834, 1789, 1518, 1342.


15 *RMN*  $^1H$  (DMSO) : 2.28 (s, 3H), 2.5 (m, 8H), 2.63 (t, 7.7Hz, 2H), 2.92 (t, 7.6Hz, 2H), 2.96 (M, 4H), 3.42 (M, 2H), 3.55 (M, 2H), 6.60 (s, 1H), 6.82 (dd, 2.6 et 8.6Hz, 1H), 6.90 (d, 2.6Hz, 1H), 7.39 (d, 8.5Hz, 1H), 7.55 (d, 8.7Hz, 2H), 8.16 (d, 8.7Hz, 2H).

*Point de fusion* : 184 °C.

20

### EXEMPLE 7

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(3-phénylpropan-1-yl)pipérazin-1-ylamide



25

Composé 7a : N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-*tert*-butyloxycarbonylpipérazin-1-ylamide

30

Le composé 7a est préparé suivant la procédure décrite dans l'exemple 1 à partir des réactifs suivants : triphosgène (2.21g, 7.75mmol) ; 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (4.94g, 22.36mmol) ; pyridine (1.81mlx2, 22.36mmolx2) ; 1-(tert-butylloxycarbonyl)pipérazine (4.16g, 22.36mmol) ; dichlorométhane (200ml).

*Masse obtenue* : 9.55g (Rdt brut : 99%)

10 *RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.43 (s, 9H); 2.55 (s, 3H); 2.90 (M, 4H); 3.16 (M, 4H); 3.42 (M, 8H); 3.77 (s, 3H); 6.71 (d, 10.1Hz, 1H); 6.93 (d, 2.3Hz, 1H); 7.18 (m, 1H); 7.44 (s, 1H).

15 **Composé 7b**: N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-pipérazin-1-ylamide

Le composé 7b est préparé suivant la même procédure que celle décrite pour le composé 2b à partir des réactifs suivants : composé 7a (9.55g, 22mmol); acide trifluoroacétique (15ml), dichlorométhane (150ml). Après la neutralisation de l'acide trifluoroacétique, les deux phases sont évaporées sous pression réduite puis le brut obtenu est filtré sur silice avec un mélange (60/40/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

25 *Masse obtenue* : 6.06g (Rdt: 83%)

*RMN 1H (DMSO)*: 2.22 (s, 3H); 2.45 (M, 4H); 2.67 (M, 4H); 2.93 (M, 4H); 3.32 (M, 4H); 3.72 (s, 3H); 6.78 (d, 8.6Hz, 1H); 7.01-7.09 (m, 2H); 8.18 (s, 1H).

30

**Composé 7** : Le composé 7 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 6a à partir des réactifs suivants : composé 7b (587mg, 1.76mmol); 1-bromo-3-phénylpropane (330ml, 2.11mmol);

carbonate de césium (860mg, 2.64mmol); diméthylformamide (20ml). le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (91/9/1) de (dichlorométhane/méthanol/ammoniaque). Deux produits sont isolés.

- 5 \* Composé le moins polaire : N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(3-phénylpropan-1-yloxy-carbonyl)pipérazin-1-ylamide

*Masse obtenue* : 187mg (Rdt : 24%)

- 10 *RMN 1H* ( $\text{CDCl}_3$ ) : 1.99 (m, 2H); 2.41 (M, 3H); 2.71 (M, 6H); 3.14 (M, 4H); 3.48 (M, 8H); 3.83 (s, 3H); 4.14 (t, 6.5Hz, 2H); 6.33 (s, 1H); 6.77 (d, 8.6Hz, 1H); 6.93-7.01 (m, 2H); 7.16-7.28 (m, 5H).

- \* Composé le plus polaire : composé 7

15

*Masse obtenue* : 300mg (Rdt : 38%)

*Analyse Élémentaire pour*:  $\text{C}_{26}\text{H}_{37}\text{N}_5\text{O}_2 \cdot 1.2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$

- 20 *Calculées*: C 61.67 ; H 7.19 ; N 11.67 ; *Expérimentales*: C 61.54 ; H 7.57 ; N 11.69

*IR* (KBr): 3435, 3026, 2938, 2838, 1649, 1508


- 25 *RMN 1H* (DMSO) : 1.76 (m, 2H); 2.37 (M, 9H); 2.56-2.68 (M, 6H); 2.99 (M, 4H); 3.42 (M, 4H); 3.73 (s, 3H); 6.58 (s, 2.4H); 6.79 (d, 8.7Hz, 1H); 7.04-7.09 (m, 2H); 7.20-7.32 (m, 5H); 8.08 (s, 1H).

*Point de fusion* : 164°C



**EXEMPLE 8**

Difumarate du 4-[2-(2,3-diméthylphényloxy)éthane-1-yl]pipérazin-1-yloate de [4-chloro-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)]phényle



**Composé 8a :** 2-chloro-1-(4-*tert*-butyloxycarbonylpipérazin-1-yl)éthanone

Le chlorure de chloroacétyle (2.42ml, 30.4mmol) est ajouté goutte à goutte à une solution de 1-*tert*-butyloxycarbonylpipérazine (5.15g, 27.6mmol) et de carbonate de calcium (8.34g, 83.4mmol) dans la méthyléthylcétone (60ml) refroidie à 0°C. Le mélange réactionnel est agité à cette température pendant 1 h 30 puis il est filtré sur Célite. La Célite est rincée plusieurs fois avec de l'acétate d'éthyle et une solution de soude 3M. Les deux phases du filtrat sont ensuite séparées et la phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée pour donner le produit attendu.

*Masse obtenue :* 4.07g (Rdt : 56%)

*RMN 1H (DMSO) :* 1.41 (s, 9H); 3.36-3.64 (M, 8H); 4.03 (s, 2H).

**Composé 8b :** 2-(2,3-diméthylphényloxy)-1-(4-*tert*-butyloxycarbonylpipérazin-1-yl)éthanone

Le composé 8b est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 6a à partir des réactifs suivants : composé 8a (1.33g, 5.07mmol); 2,3-diméthylphénol (620mg, 5.07mmol); carbonate de césium (3.3g, 10.1mmol); diméthylformamide (20ml). Le mélange est agité pendant 12h. Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (91/9/1) de (dichlorométhane/méthanol/ammoniaque).

*Masse obtenue* : 1.95g (Rdt quantitatif)

*RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.41 (s,9H); 2.11 (s,3H); 2.21 (s,3H); 3.37 (M,4H);  
3.52 (M,4H); 4.62 (s,2H); 6.62 (d,7.6Hz,1H); 6.75 (d,7.4Hz,1H); 6.98  
(t,7.8Hz,1H).

**Composé 8c**: 2-(2,3-diméthylphényloxy)-1-(pipérazin-1-yl)éthanone

Le composé 8c est préparé suivant la même procédure que celle décrite  
pour le composé 2b à partir des réactifs suivants : composé 8b  
(1.95g,5.07mmol); acide trifluoroacétique (5.0ml), dichlorométhane  
(25ml). Le brut est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange  
(90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 991mg (Rdt : 79%)

*RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>)* : 2.18 (s,3H); 2.27 (s,3H); 2.85 (t,5.1Hz,4H); 3.60  
(M,4H); 4.67 (s,2H); 6.73 (d,8.2Hz,1H); 6.81 (d,7.5Hz,1H); 7.05  
(t,7.9Hz,1H).

**Composé 8d**: 1-(2,3-diméthylphényloxyéthan-1-yl)pipérazine

Le composé 8d est préparé suivant la procédure décrite pour le  
composé 3a à partir des réactifs suivants : composé 8c  
(515mg,2.08mmol); hydrure de lithium et d'aluminium (3.1ml d'une  
solution 1M dans le tétrahydrofurane,3.1mmol); éther éthylique  
(10ml). La réaction dure 3h. Le brut réactionnel est engagé tel quel  
dans l'étape suivante.

*Masse obtenue* : 354mg (Rdt : 73%)

**Composé 8e :** 1-chlorocarbonyl-4-(2,3-diméthylphényloxyéthan-1-yl)pipérazine

Le composé 8e est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 5c à partir des réactifs suivants : composé 8d (354mg, 1.51mmol); triphosgène (150mg, 0.50mmol); pyridine (125ml, 1.51mmol); dichlorométhane (40ml). Le brut réactionnel est purifié avec un gradient de (99.5/0.5/0.5) à (95/5/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 336mg (Rdt : 75%)

RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>) : 2.14 (s, 3H); 2.27 (s, 3H); 2.66 (t, 5.2Hz, 4H); 2.88 (t, 5.4Hz, 2H); 3.64-3.77 (M, 4H); 4.09 (t, 5.4Hz, 2H); 6.68 (d, 8.1Hz, 1H); 6.79 (d, 7.5Hz, 1H); 7.04 (t, 7.8Hz, 1H).

**composé 8 :**

Le composé 8 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 5 à partir des réactifs suivants : composé 8e (333mg, 1.12mmol); 4-chloro-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phénol (255mg, 1.12mmol); hydrure de sodium (50%, 50mg, 1.12mmol); tétrahydrofurane (20ml). Le brut réactionnel est purifié avec un mélange (95/5/1) puis (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 379mg (Rdt : 70%)

Analyse Élémentaire pour: C<sub>26</sub>H<sub>35</sub>ClN<sub>4</sub>O<sub>3</sub>-2C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>-0.65H<sub>2</sub>O

Calculées: C 55.87 ; H 6.11 ; N 7.67 ; Expérimentales: C 55.63 ; H 6.10 ; N 7.58

IR (KBr): 3434, 2940, 1722, 1591, 1255


RMN  $^1\text{H}$  (DMSO) : 2.09 (s,3H); 2.2 (s,3H); 2.37 (s,3H); 2.2.60 (M,4H); 2.67 (M,4H); 2.81 (t,5.5Hz,2H); 3.03 (M,4H); 3.45 (M,2H); 3.59 (M,2H); 4.08 (t,5.6Hz,2H); 6.62 (s,4H); 6.74-7.07 (m,5H); 7.40 (d,8.5Hz,1H).

5

Point de fusion : 85°C

#### EXEMPLE 9

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-[3-  
10 (4-fluorophényl)-3-oxopropan-1-yl]pipérazin-1-ylamide



15 Une solution de 3-chloro-4-fluoropropiophénone (340mg;1.8mmol) est agitée pendant 5h à température ambiante en présence de N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-pipérazin-1-ylamide (7b) (500mg;1.5mmol), carbonate de potassium (310mg;2.25mmol) et d'iodure de potassium (une pointe de spatule) dans la méthyléthylcétone  
20 (20ml) . Le mélange réactionnel est ensuite versé dans l'eau et extrait trois fois à l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont réunies, lavées avec une solution saturée en chlorure de sodium, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est  
25 purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 440mg (Rdt : 76%)

Analyse Élémentaire pour:  $\text{C}_{26}\text{H}_{34}\text{FN}_5\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4 \cdot 0.45\text{H}_2\text{O}$

Calculées: C 59.29 ; H 6.45 ; N 11.52 ; Expérimentales: C 59.16 ; H 6.42 ; N 11.34


IR (KBr): 3435,3314,2838,1689,1602,1508

RMN  $^1\text{H}$  (DMSO) : 2.33 (s,3H); 2.43 (M,4H); 2.62 (M,4H); 2.70 (t,7.0Hz,2H); 2.96 (M,4H); 3.23 (t,7.1Hz,2H); 3.39 (M,4H); 3.71 (s,3H); 6.57 (s,2H); 6.78 (d,8.7Hz,1H); 7.02-7.08 (m,2H); 7.35 (t,8.8Hz,2H); 8.07 (dd,5.5 et 8.8Hz,2H); 8.27 (s,1H).

Point de fusion : 132°C

#### EXEMPLE 10

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-[(E)-styrilcarbonyl]pipérazin-1-ylamide



10

Le composé 10 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 2a à partir des réactifs suivants : composé 7b (500mg, 1.5mmol); acide cinnamique (220mg, 1.5mmol); chlorhydrate de la 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide (290mg, 1.5mmol); 4-diméthylaminopyridine (une pointe de spatule); dichlorométhane (15ml). La réaction dure 5h. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 414mg (Rdt : 60%)

Analyse Élémentaire pour:  $\text{C}_{26}\text{H}_{33}\text{N}_5\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4 \cdot 0.27\text{H}_2\text{O}$

Calculées: C 61.65 ; H 6.47 ; N 11.98 ; Expérimentales: C 61.56 ; H 6.65 ; N 11.80


IR (KBr) : 3395,3005,2831,1702,1642

RMN <sup>1</sup>H (DMSO) : 2.39 (s,3H); 2.70 (M,4H); 3.02 (M,4H); 3.41 (M,4H); 3.63 (M,2H); 3.75 (M,5H); 6.59 (s,2H); 6.83(d,8.6Hz,1H); 7.07-7.12 (M,2H); 7.28-7.59 (M,5H); 7.77 (M,2H); 8.43 (s,1H).

Point de fusion : 180°C

### EXEMPLE 11

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(2,3-diméthylphénylcarbonyl)pipérazin-1-ylamide.



Le composé 11 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 2a à partir des réactifs suivants : composé 7b (500mg,1.5mmol); acide 2,3-diméthylbenzoïque (220mg,1.5mmol); chlorhydrate de la 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide (290mg, 1.5mmol); 4-diméthylaminopyridine (une pointe de spatule); dichlorométhane (20ml). La réaction dure 2h. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 479mg (Rdt : 68%)

Analyse Élémentaire pour: C<sub>26</sub>H<sub>35</sub>N<sub>5</sub>O<sub>3</sub>·C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>·0.3H<sub>2</sub>O

Calculées: C 61.38 ; H 6.80 ; N 11.93 ; Expérimentales: C 61.31 ; H 6.97 ; N 11.58


IR (KBr) : 3422,2918,2838,1709,1635,1508

RMN <sup>1</sup>H (DMSO) : 2.10 (s,3H); 2.25 (s,3H); 2.38 (s,3H); 2.70 (M,4H);  
2.98 (M,4H); 3.11 (M,2H); 3.31 (M,2H); 3.51 (M,2H); 3.68 (M,2H);  
3.71 (s,3H); 6.55 (s,2H); 6.78 (d,8.7Hz,1H); 6.98-7.21 (m,5H); 8.38  
(s,1H).

Point de fusion : 185°C

#### 10 **EXEMPLE 12**

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-  
(2,4,5-triméthylphénylaminocarbonyl)pipérazin-1-ylamide



12

15

Le composé 12 est préparé suivant la procédure décrite pour le  
composé 1 à partir des réactifs suivants : composé 7b  
(500mg,1.5mmol); 2,4,5-triméthylaniline (200mg,1.5mmol);  
triphosgène (160mg,0.55mmol); pyridine (130mlx2,1.65mmolx2);  
20 dichlorométhane (30ml). Le brut réactionnel est purifié par  
chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de  
dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 376mg (Rdt : 51%)

25

Analyse Élémentaire pour: C<sub>27</sub>H<sub>38</sub>N<sub>6</sub>O<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>

Calculées: C 60.97 ; H 6.93 ; N 13.76 ; Expérimentales: C 60.86 ; H  
7.06 ; N 13.75

30

IR (KBr) : 3301,2918,2838,1635,1510


RMN  $^1\text{H}$  (DMSO) : 2.10 (s,6H); 2.22 (s,3H); 2.36 (s,3H); 2.67 (M,4H);  
2.99 (M,4H); 3.46 (M,8H); 3.73 (s,3H); 6.58 (s,2H); 6.81 (d,8.7Hz,1H);  
6.85 (s,2H); 7.05-7.11 (m,2H); 7.86 (s,1H); 8.36 (s,1H).

5 Point de fusion : 245°C

### EXEMPLE 13

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(5,6,7,8-tétrahydronaphtylaminocarbonyl)pipérazin-1-ylamide

10



13

Le composé 13 est préparé suivant la procédure décrite pour le  
composé 1 à partir des réactifs suivants : composé 7b  
15 (604mg,1.81mmol); 5,6,7,8-tétrahydronaphtylamine (301mg,2.0mmol);  
triphosgène (202mg,0.68mmol); pyridine (162mlx2,1.81mmolx2);  
dichlorométhane (60ml). Le brut réactionnel est purifié par  
chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de  
dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

20

Masse obtenue : 678mg (Rdt : 74%)

Analyse Élémentaire pour :  $\text{C}_{28}\text{H}_{38}\text{N}_6\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4 \cdot 0.55\text{H}_2\text{O} \cdot 0.4\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

25 Calculées: C 60.94 ; H 7.17 ; N 12.69 ; Expérimentales: C 60.97 ; H  
7.44 ; N 12.59

IR (KBr) : 3295,2932,2851,1642,1508




RMN  $^1\text{H}$  (DMSO) : 1.67 (M,4H); 2.30 (s,3H); 2.59 (M,6H); 2.70 (M,2H); 2.95 (M,4H); 3.43 (M,8H); 3.71 (s,3H); 6.56 (s,2H); 6.79 (d,8.7Hz,1H); 6.87 (m,1H); 6.98-7.08 (m,4H); 7.95 (s,1H); 8.33 (s,1H).

5 Point de fusion : 144°C

#### EXEMPLE 14

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(2,4,6-triméthylbenzènesulfonyl)pipérazin-1-ylamide

10



14

Une solution de chlorure de mésitylènesulfonyle (650mg,2.97mmol) dans le dichlorométhane (5ml) est ajoutée à une solution du composé 7b (500mg,1.50mmol) dans la soude 1M (1.1ml) à 0°C. Le mélange biphasique est ensuite ramené à température ambiante et agité pendant 5h. Après ce temps, les deux phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite trois fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques réunies sont lavées avec une solution saturée en chlorure de sodium, sèches sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) puis (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

25 Masse obtenue : 330mg (Rdt : 43%)

Analyse Élémentaire pour:  $\text{C}_{26}\text{H}_{37}\text{N}_5\text{O}_4\text{S}-\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$

Calculées: C 57.04 ; H 6.54 ; N 11.09 ; Expérimentales: C 56.85 ; H 6.69 ; N 10.91

30 IR (KBr) : 3402,2938,2851,1642,1508


*RMN <sup>1</sup>H (DMSO)* : 2.28 (s,3H); 2.35 (s,3H); 2.56 (s,6H); 2.62 (M,4H); 3.01 (M,8H); 3.45 (M,4H); 3.71 (s,3H); 6.57 (s,2H); 6.79 (d,8.7Hz,1H); 6.98-7.16 (2H); 7.10 (s,2H); 8.40 (s,1H).

5 *Point de fusion* : 175°C

### EXEMPLE 15

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(2-naphtyl-2-oxoéthan-1-yl)pipérazin-1-ylamide

10



15

### Composé 15a : (pipérazin-1-yl)méthyl-2-naphtylcétone

15

Le composé 15a est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 6a à partir des réactifs suivants : bromométhyl-2-naphtylcétone (5g,20mmol); pipérazine (8.6g,2.100mmol); carbonate de césium (9.8g,30mmol); diméthylformamide (200ml). le brut est purifié  
20 par chromatographie-éclair avec un mélange (85/15/1) puis (80/18/2) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 1.03g (Rdt : 20.2%)

25 *RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 2.64 (M,4H); 2.97 (M,4H); 3.92 (s,2H); 7.58 (m,2H); 7.83-8.03 (m,4H); 8.52 (s,1H).

### Composé 15 :

Le composé 15 est préparé suivant la procédure décrite pour le  
30 composé 1 à partir des réactifs suivants : composé 15a (588mg,2.31mmol); 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline

(490mg, 2.31mmol); triphosgène (250mg, 0.84mmol); pyridine (200mlx2, 2.53mmolx2); dichlorométhane (50ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 248mg (Rdt : 21%)

Analyse Élémentaire pour:  $C_{29}H_{35}N_5O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot H_2O$

Calculées: C 62.35 ; H 6.50 ; N 11.02 ; Expérimentales: C 63.03 ; H 6.47 ; N 11.19


IR (KBr) : 3395, 2925, 2838, 1514, 1232

RMN  $^1H$  (DMSO) : 2.33 (s, 3H); 2.60 (M, 8H); 2.96 (M, 4H); 3.44 (M, 4H); 3.70 (s, 3H); 4.05 (s, 2H); 6.56 (s, 2H); 6.78 (d, 8.7Hz, 1H); 7.04 (m, 2H); 7.64 (m, 2H); 7.99 (m, 2H); 8.10 (m, 1H); 8.27 (s, 1H); 8.70 (s, 1H).

Point de fusion : 123°C

#### EXEMPLE 16

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-benzylpipérazin-1-ylamide



16

Le composé 16 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (457mg, 2.07mmol); 1-benzylpipérazine

(364mg, 2.07mmol); triphosgène (205mg, 0.69mmol); triéthylamine (290mlx2, 2.07mmolx2); dichlorométhane (40ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) puis (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

5

Masse obtenue : 776mg (Rdt : 89%)

Analyse Élémentaire pour:  $C_{24}H_{33}N_5O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot 0.25H_2O$

Calculées: C 61.81 ; H 6.95 ; N 12.87 ; Expérimentales: C 62.17 ; H 7.04 ; N 12.81

10

Masse (DCI/NH<sub>3</sub>) : 424 (MH<sup>+</sup>), 248, 177, 137, 120

IR (KBr) : 3414, 2833, 1637, 1604, 1508, 1234

15

RMN 1H (DMSO) : 2.35 (M, 7H); 2.65 (M, 4H); 2.97 (M, 4H); 3.35 (M, 4H); 3.49 (s, 2H); 3.71 (s, 3H); 6.56 (s, 2H); 6.77 (d, 1H); 7.04 (m, 2H); 7.30 (m, 5H); 8.26 (s, 1H).


20

Point de fusion : 145°C

### EXEMPLE 17

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(4-fluorobenzyl)oxopipéridin-1-ylamide

25



17

Le composé 17 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (398mg, 1.80mmol); 4-

30

fluorobenzyloxopipéridine (608mg, 2.93mmol); triphosgène (180mg, 0.60mmol); pyridine (150mlx2, 1.80mmolx2); dichlorométhane (40ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) puis (90/9/1) de  
 5 dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 646mg (Rdt : 79%)

*Analyse Élémentaire pour*:  $C_{25}H_{31}FN_4O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot 0.45H_2O$

10 *Calculées*: C 60.19 ; H 6.25 ; N 9.68 ; *Expérimentales*: C 60.39 ; H 6.24 ; N 9.63

*Masse (DCI/NH<sub>3</sub>)* : 455(MH<sup>+</sup>), 248, 208


15 *IR (KBr)* : 3400, 2952, 2838, 1678, 1638, 1597, 1233

*RMN <sup>1</sup>H (DMSO)* : 1.10 (m, 2H); 1.46 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 2.74 (M, 4H); 2.98 (M, 6H); 3.74 (M, 4H); 4.15 (de, 13 Hz, 2H); 6.60 (s, 2H); 6.81 (d, 8.6 Hz, 1H); 7.06 (m, 2H); 7.39 (t, 8.8 Hz, 2H); 8.13 (m, 2H); 8.30 (s, 1H).  
 20

*Point de fusion* : 118°C

### **EXEMPLE 18**

25 **Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-benzylpipéridin-1-ylamide**



18

30

Le composé 18 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (480mg, 2.17mmol); benzyloxy-4-méthylpipéridine (382ml, 2.17mmol); triphosgène (215mg, 0.72mmol); triéthylamine (300ml x 2, 2.17mmol x 2); dichlorométhane (40ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 780mg (Rdt : 85%)

Analyse Élémentaire pour:  $C_{25}H_{34}N_4O_2 \cdot C_4H_4O_4$

Calculées: C 64.67 ; H 7.11 ; N 10.40 ; Expérimentales: C 65.03 ; H 7.41 ; N 10.61

Masse (DCI/ $NH_3$ ) : 423 (MH<sup>+</sup>), 248, 176


IR (KBr) : 3408, 2934, 2841, 1707, 1637, 1500

RMN  $^1H$  (DMSO) : 1.07 (m, 2H); 1.61 (m, 3H); 2.34 (s, 3H); 2.53 (m, 2H); 2.63 (m, 6H); 2.98 (m, 4H); 3.73 (s, 3H); 4.06 (m, 2H); 6.59 (s, 2H); 6.79 (d, 8.7 Hz, 1H); 7.02-7.34 (m, 7H); 8.22 (s, 1H).

Point de fusion : 160°C

#### EXEMPLE 19

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(3-phénylpropan-1-yl)pipéridin-1-ylamide



19

Le composé 19 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (516mg, 2.33mmol); 4-(3-phénylpropan-1-yl)pipéridine (473mg, 2.33mmol); triphosgène (231mg, 0.78mmol); triéthylamine (330mlx2, 2.33mmolx2); dichlorométhane (40ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (94/6/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 712mg (Rdt : 68%)

Analyse Élémentaire pour:  $C_{27}H_{38}N_4O_2 \cdot 2C_4H_4O_4$

Calculées: C 61.57 ; H 6.79 ; N 8.21 ; Expérimentales: C 61.65 ; H 6.90 ; N 8.37


Masse (DCI/NH<sub>3</sub>) : 451 (MH<sup>+</sup>), 248, 204, 136

IR (KBr) : 3384, 3025, 2930, 2849, 1709, 1504

RMN 1H (DMSO) : 0.88-1.65 (m, 9H); 2.38 (s, 3H); 2.50 (m, 2H); 2.72 (m, 6H); 2.98 (m, 4H); 3.69 (s, 3H); 4.00 (m, 1H); 4.07 (m, 1H); 6.55 (s, 4H); 6.75 (d, 8.6 Hz, 1H); 7.01-7.28 (m, 7H); 8.17 (s, 1H).

#### EXEMPLE 20

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(1,2,3,4-tétrahydronaphtyl-1)pipérazin-1-ylamide



20

30

**Composé 20a : 1-(1,2,3,4-tétrahydronaphtyl)pipérazine**

Une solution de 1,2,3,4-tétrahydronaphtylamine (6ml,41.8mmol) et du chlorhydrate de la bis(2-chloroéthyl)amine (7.44g,41.8mmol) en présence de carbonate de sodium (2.22g,20.9mmol) dans le butanol-1 est portée au reflux pendant 48h. Après ce temps le butanol-1 est évaporé sous pression réduite et le brut réactionnel est imprégné sur silice puis purifié par chromatographie-éclair avec un gradient de (98/2/1) à (80/20/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

10

*Masse obtenue : 386mg (Rdt : 4.3%)*

*RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>) : 1.66 (m,2H); 1.93 (m,2H); 2.40-2.97 (M,10H); 3.74 (M,1H); 6.99-7.17 (m,3H); 7.68 (M,1H).*

15

**Composé 20 :**

Le composé 20 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (375mg,1.70mmol); composé 20a (380mg,1.76mmol); triphosgène (168mg, 0.57mmol); triéthylamine (235mlx2,1.70mmolx2); dichlorométhane (40ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) puis (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

25

*Masse obtenue : 470mg (Rdt : 60%)*

*Analyse Élémentaire pour: C<sub>27</sub>H<sub>37</sub>N<sub>5</sub>O<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>-0.35H<sub>2</sub>O*

*Calculées: C 63.54 ; H 7.17 ; N 11.95 ; Expérimentales: C 63.64 ; H 7.23 ; N 12.09*

30

*Masse (DCI/NH<sub>3</sub>) : 464 (MH<sup>+</sup>),248,217,136*

*IR (KBr) : 3395,2932,2835,1707,1637,1604,1506,1232*




RMN  $^1\text{H}$  (DMSO) : 1.62 (m, 2H); 1.91 (m, 2H); 2.35 (s, 3H); 2.51 (M, 4H); 2.67 (M, 6H); 2.98 (M, 4H); 3.44 (M, 4H); 3.73 (s, 3H); 3.84 (M, 1H); 6.59 (s, 2H); 6.80 (d, 8.6 Hz, 1H); 7.12 (m, 5H); 7.63 (m, 1H); 8.27 (s, 1H).

Point de fusion : 110-111°C

### EXEMPLE 21

Fumarate du N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-(1,2,3,4-tétrahydronaphtyl-2)pipérazin-1-ylamide



21

### Composé 21a : 2-(1,2,3,4-tétrahydronaphtyl)pipérazine

Une solution de b-tétalone (970mg, 6.6mmol) et de pipérazine (2.85mg, 33.0mmol) dans le toluène (30ml) est portée au reflux en présence d'acide para-toluènesulfonique (pointe de spatule) avec entraînement azéotropique de l'eau. Après 48h, le mélange réactionnel est refroidi et dilué avec de l'éthanol (30ml). Il est ensuite placé sous pression d'hydrogène (45 PSI) en présence d'oxyde de platine (116mg). Au bout de 7h, le mélange est filtré sur Célite, concentré sous pression réduite et purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (95/5/1) à (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

Masse obtenue : 970mg (Rdt : 68%)

Masse (DCI/NH<sub>3</sub>) : 217 (MH<sup>+</sup>), 177, 148, 132, 110

*RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.65 (m,1H); 2.10 (M,2H); 2.63-2.97 (M,13H); 7.09 (s,4H).

**Composé 21 :**

- 5 Le composé 21 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (665mg,3.00mmol); composé 21a (680mg,3.15mmol); triphosgène (297mg, 3.00mmol); triéthylamine (243mlx2,3.00mmolx2); dichlorométhane (50ml). Le brut réactionnel  
10 est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

*Masse obtenue* : 931mg (Rdt : 67%)

- 15 *Analyse Élémentaire pour*: C<sub>27</sub>H<sub>37</sub>N<sub>5</sub>O<sub>2</sub>·1.2C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O  
*Calculées*: C 61.51 ; H 7.11 ; N 11.28 ; *Expérimentales*: C 61.45 ; H 6.79 ; N 10.94

*Masse (DCI/NH<sub>3</sub>)*: 464 (MH<sup>+</sup>),248,217,180,136


- 20 *IR (KBr)* : 3301,2932,2844,1663,1508,1239

- RMN 1H (DMSO)* : 1.60 (M,1H); 1.99 (M,1H); 2.35 (s,3H); 2.56-2.67 (M,13H); 2.97 (M,4H); 3.40 (M,4H); 3.70 (s,3H); 6.56 (s,2.4H); 6.78  
25 (d,8.7Hz,1H); 7.05 (M,6H); 8.27 (s,1H).

*Point de fusion* : 168-170°C

**EXEMPLE 22**

**N-[4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]-4-phénylcarboxamidopipéridin-1-ylamide**

**22****Composé 22a : 1-benzyl-4-phénylcarboxamidopipéridine**

Le dichlorhydrate monohydraté de la 1-benzyl-4-aminopipéridine (9g,34mmol) est dessalifié puis mis en solution dans le dichlorométhane (70ml) en présence de triéthylamine (7.13ml,51mmol). Celle-ci est refroidie dans un bain de glace puis le chlorure de benzoyle (3.74ml,40mmol) est additionné lentement. Le mélange réactionnel est ensuite ramené à température ambiante, agité 10mn puis versé sur un bain de glace. Le pH de la phase aqueuse est ramené à ~11 avec une solution de soude diluée puis les phases sont séparées. La phase organique est lavée avec une solution saturée en chlorure de sodium avant d'être séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée.

*Masse obtenue* : 8.8g (Rdt brut : 88%)

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.46 (m,2H); 2.01 (M,2H); 2.17 (td,2.3 et 11.6Hz,2H); 2.85 (M,2H); 3.51 (s,2H); 4.012 (m,1H); 6.00 (de,1H); 7.31 (M,6H); 7.48 (M,2H); 7.73 (dd,1.4 et 5.6Hz,2H).

**Composé 22b : 4-phénylcarboxamidopipéridine**

Le composé 22a (3.55g,12mmol) dissous dans le méthanol (160ml) est placé sous pression d'hydrogène (40 PSI) en présence d'hydroxyde de palladium et d'acide acétique (20ml) pendant 4h. Le mélange

réactionnel est ensuite filtré sur Célite et concentré. L'huile obtenue est dissoute dans le dichlorométhane et lavée trois fois avec une solution de soude 4M. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée.

5 *Masse obtenue* : 1.13g (Rdt brut : 46%)

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.46 (m,2H); 2.05 (M,2H); 2.76 (td,2.4 et 12.1Hz,2H); 3.17 (M,2H); 4.10 (m,1H); 6.17 (de,1H); 7.44 (M,3H);  
10 7.75 (dd,1.5 et 7.5Hz,2H).

**Composé 22 :**

Le composé 22 est préparé suivant la procédure décrite pour le composé 1 à partir des réactifs suivants : 4-méthoxy-3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline (433mg,1.96mmol); composé 22b  
15 (400mg,1.96mmol); triphosgène (210mg, 0.72mmol); pyridine (170mlx2,2.15mmolx2); dichlorométhane (60ml). Le brut réactionnel est purifié par chromatographie-éclair avec un mélange (90/9/1) de dichlorométhane/méthanol/ammoniaque.

20 *Masse obtenue* : 353mg (Rdt : 40%)

*RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>)* : 1.46 (m,2H); 2.10 (m,2H); 2.34 (s,3H); 2.61 (M,4H); 3.12 (M,6H); 3.82 (s,3H); 4.18 (de,2H); 4.22 (M,1H); 6.03  
25 (d,7.7Hz,1H); 6.28 (s,1H); 6.75 (d,9.4Hz,1H); 6.95 (m,2H); 7.45 (m,3H); 7.75 (dd,1.8 et 6.0Hz,2H).

Les dérivés de la présente invention sont des antagonistes puissants des récepteurs 5HT<sub>1D</sub> comme le montrent les études de liaison et les études  
30 d'antagonisme de l'inhibition de l'adénylate cyclase (stimulée par la forskoline) par un agoniste 5HT<sub>1D</sub> tel que la sérotonine, le sumatriptan ou la 5-CT, études qui ont été réalisées au niveau des récepteurs humains clonés 5HT<sub>1Dα</sub> et 5HT<sub>1Dβ</sub>.

Les récepteurs humains 5HT<sub>1Da</sub> et 5HT<sub>1Db</sub> ont été clonés selon les séquences publiées par M. Hamblin et M. Metcalf, Mol. Pharmacol., 40,143 (1991) et Weinshenk et coll., Proc. Natl. Acad. Sci. 89,3630 (1992).

La transfection transitoire et la transfection permanente des gènes de ces récepteurs a été réalisée dans des lignées cellulaires Cos-7 et CHO-K<sub>1</sub> en utilisant un électroporateur.

La lignée cellulaire HeLa HA7 exprimant le récepteur 5HT<sub>1A</sub> humain a été obtenue de Tulco (Duke Univ., Durham, N.C., USA) et cultivée selon la méthode de Fargin et coll., J. Biol. Chem. 264,14848 (1989).

L'étude de la liaison des dérivés de la présente invention avec les récepteurs 5HT<sub>1Da</sub>, 5HT<sub>1Db</sub> et 5HT<sub>1A</sub> humains a été réalisée selon la méthode décrite par P. Pauwels et C. Palmier (Neuropharmacology, 33,67,1994).

Les milieux d'incubation pour ces mesures de liaison comprennent 0.4 ml de préparation de membrane cellulaire, 0.05ml d'un ligand tritié [3H]-5CT (concentration finale : 2nM) pour les récepteurs 5HT<sub>1Da</sub> et 5HT<sub>1Db</sub> et [3H]-8OH-DPAT (concentration finale : 1 nM) pour le récepteur 5HT<sub>1A</sub> et 0.05 ml de la molécule à tester (concentrations finales de 0.1 nM à 1000 nM) ou 10 µM (concentration finale) de sérétonine (5HT<sub>1Da</sub> et 5HT<sub>1Db</sub>) ou 1 µM (concentration finale) de spiroxatrine (5HT<sub>1A</sub>).

L'étude de l'inhibition de la formation d'AMP cyclique (stimulée par la forskoline) médiée par les récepteurs 5HT<sub>1Da</sub> et 5HT<sub>1Db</sub> humains a été réalisée dans des cellules transfectées par le récepteur selon une technique décrite préalablement (P. Pauwels et C. Palmier, Neuropharmacology, 33,67,1994; Cell. Pharmacol. 2,183,1995; Cell. Pharmacol. 2,49,1995; Eur. J. of Pharmacol. (Mol. Pharm.) 290, 95, 1995).

Les nouveaux composés dérivés d'aryl pipérazines faisant partie de la présente invention sont des antagonistes puissants et sélectifs des récepteurs 5HT<sub>1D</sub> et présentent l'avantage d'être particulièrement sélectifs pour les récepteurs 5HT<sub>1D</sub> humains en particulier par rapport aux récepteurs 5HT<sub>1A</sub>, 5HT<sub>1C</sub>, 5HT<sub>2</sub>, α<sub>1</sub>, α<sub>2</sub> et D<sub>2</sub>.

Les dérivés de la présente invention sont en outre capables d'inhiber la contraction induite par la 5-hydroxytryptamine dans les anneaux de veine

saphène de lapin et d'antagoniser l'inhibition induite par la 5-carboxamidotryptamine (5CT) au niveau de la libération de sérotonine dans les tranches de cerveau de cobaye. Ces deux modèles pharmacologiques sont généralement reconnus comme particulièrement pertinents dans la


5 caractérisation fonctionnelle des récepteurs  $5HT_{1D}$  et, dans le cas des produits de la présente invention, permettent de mettre en évidence leur activité antagoniste au niveau de ces récepteurs.

Les dérivés de la présente invention se distinguent sans ambiguïté de l'art antérieur par leur structure chimique originale mais également par leur

10 profil biologique. En effet, la comparaison des produits de la présente invention avec l'art antérieur le plus proche (demande de brevet FR 9408981) met en évidence, de façon inattendue, la supériorité des produits de la présente invention, comme l'illustre l'étude comparative suivante (table 1).

15

Table 1



	Ki (nM)		1A
	1D $\alpha$	1D $\beta$	
Z <sub>1</sub> est omis*	340	18	450
Z <sub>1</sub> = CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> **	2.1	1.9	3500

20 \*Composé revendiqué dans la demande de brevet FR 9408981

\*\*Composé revendiqué dans la présente invention (exemple 1)

La comparaison décrite ci-dessus démontre, à titre illustratif, que les produits de la présente invention présentent l'avantage d'avoir une meilleure

25 affinité et une meilleure sélectivité en particulier vis-à-vis du récepteur  $5HT_{1A}$ , au niveau des récepteurs  $5HT_{1D}$  et en particulier au niveau du

récepteur 5HT<sub>1Dα</sub>. Ces propriétés nouvelles et inattendues des antagonistes 5HT<sub>1D</sub> revendiqués dans la présente invention les rendent particulièrement intéressants et utiles pour le traitement des patients souffrant de désordres au niveau du système nerveux central. De ce fait, la présente invention comprend également une méthode pour traiter de tels patients, méthode qui met en oeuvre l'administration d'une dose active d'un composé répondant à la formule générale (I). Les études d'activité antagoniste au niveau de la cyclase médiée par les récepteurs 5HT<sub>1Dα</sub> et 5HT<sub>1Dβ</sub> démontrent par ailleurs que l'exemple illustratif de la présente invention repris dans la table 1 ci-dessus est un antagoniste puissant et silencieux, à la fois du récepteur 5HT<sub>1Dβ</sub> mais aussi 5HT<sub>1Dα</sub>. Ces propriétés mettent bien en évidence les caractéristiques biologiques uniques des dérivés de la présente invention, en particulier si l'on compare ces données avec les données obtenues avec le dérivé GR-127935 qui, dans les mêmes conditions apparait comme un agoniste du récepteur 5HT<sub>1Dα</sub> humain (cf. Pauwels et Colpaert, *Neuropharmacol.*, **34**, 235, 1995).

Par ailleurs, les dérivés de la présente invention sont également capables de contrôler la croissance et la prolifération de cellules gliales de type C6 transfectées par le gène du récepteur 5HT<sub>1Dβ</sub> et par le gène du récepteur 5HT<sub>1Dα</sub> stimulées par un médiateur hormonal tel que la sérotonine. A titre d'exemple, les exemples de la présente invention inhibent l'incorporation de thymidine marquée (stimulée par 0.1 μM de sumatriptan) avec une CI<sub>50</sub> de 10 à 100 nM (méthode décrite par P. Pauwels et coll., *J. of Neurochemistry*, sous presse). A ce titre, les dérivés de la présente invention trouvent donc également leur utilité dans le traitement de cancers et autres désordres liés à la prolifération cellulaire.

Doivent également être considérée comme faisant partie de la présente invention les compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédients actifs, un composé de formule générale (I) ou un sel physiologiquement acceptable d'un composé de formule (I) associé à un ou plusieurs agents thérapeutiques, tels que, par exemple des agents antidépresseurs comme les

antidépresseurs tricycliques (par exemple amitriptyline, clomipramine, desipramine, imipramine), les inhibiteurs de mono-amine oxydase (par exemple isocarboxazide, moclobemide, phenelzine ou tranylcyclopramine), les inhibiteurs de re-uptake de sérotonine (par exemple fluvoxamine, 5 sertraline, fluoxetine, paroxetine ou citalopram), les inhibiteurs de re-uptake de sérotonine et nor-adréraline (par exemple le milnacipran), ou les antagonistes  $\alpha_2$  (miansérine, mirtazapine, setiptiline, idazoxan, effaroxan, fluparoxan par exemple).

10 Les dérivés de la présente invention ou leurs sels physiologiquement acceptables peuvent également être administrés sous forme de compositions pharmaceutiques, en association avec un antagoniste du récepteur 5-HT<sub>1A</sub> (tel que, par exemple le pindolol, le WAY 100135, le UH-301 ou le WAY 100635). Cette association fait également partie de la présente invention.

15 La présente invention a également pour objet les compositions pharmaceutiques contenant comme principe actif un composé de formule générale I ou un de ses sels acceptables pour l'usage pharmaceutique, mélangé ou associé à un excipient approprié. Ces compositions peuvent 20 revêtir, par exemple, la forme de compositions solides, liquides, d'émulsions, lotions ou crèmes.

Comme compositions solides pour administration orale, peuvent être utilisés des comprimés, des pilules, des poudres (capsules de gélatine, cachets) ou 25 des granulés. Dans ces compositions, le principe actif selon l'invention est mélangé à un ou plusieurs diluants inertes, tels que amidon, cellulose, saccharose, lactose ou silice, sous courant d'argon. Ces compositions peuvent également comprendre des substances autres que les diluants, par exemple un ou plusieurs lubrifiants tels que le stéarate de magnésium ou le 30 talc, un colorant, un enrobage (dragées) ou un vernis.

Comme compositions liquides pour administration orale, on peut utiliser des solutions, des suspensions, des émulsions, des sirops et des élixirs



pharmaceutiquement acceptables contenant des diluants inertes tels que l'eau, l'éthanol, le glycérol, les huiles végétales ou l'huile de paraffine. Ces compositions peuvent comprendre des substances autres que les diluants, par exemple des produits mouillants, édulcorants, épaississants, aromatisants ou stabilisants.

Les compositions stériles pour administration parentérale, peuvent être de préférence des solutions aqueuses ou non aqueuses, des suspensions ou des émulsions. Comme solvant ou véhicule, on peut employer l'eau, le propylèneglycol, un polyéthylèneglycol, des huiles végétales, en particulier l'huile d'olive, des esters organiques injectables, par exemple l'oléate d'éthyle ou autres solvants organiques convenables. Ces compositions peuvent également contenir des adjuvants, en particulier des agents mouillants, isotonisants, émulsifiants, dispersants et stabilisants. La stérilisation peut se faire de plusieurs façons, par exemple par filtration aseptisante, en incorporant à la composition des agents stérilisants, par irradiation ou par chauffage. Elles peuvent également être préparées sous forme de compositions solides stériles qui peuvent être dissoutes au moment de l'emploi dans de l'eau stérile ou tout autre milieu stérile injectable.

Les compositions pour administration rectale sont les suppositoires ou les capsules rectales qui contiennent, outre le produit actif, des excipients tels que le beurre de cacao, des glycérides semi-synthétiques ou des polyéthylèneglycols.

Les compositions pour administration topique peuvent être par exemple des crèmes, lotions, collyres, collutoires, gouttes nasales ou aérosols.

Les doses dépendent de l'effet recherché, de la durée du traitement et de la voie d'administration utilisée ; elles sont généralement comprises entre 0,001 g et 1 g (de préférence comprises entre 0,005 g et 0,25 g) par jour de préférence par voie orale pour un adulte avec des doses unitaires allant de 0,1 mg à 500 mg de substance active, de préférence de 1 mg à 50 mg.

D'une façon générale, le médecin déterminera la posologie appropriée en fonction de l'âge, du poids et de tous les autres facteurs propres au sujet à traiter. Les exemples suivants illustrent des compositions selon l'invention [dans ces exemples, le terme "composant actif" désigne un ou plusieurs (généralement un) des composés de formule (I) selon la présente invention]:

### Comprimés

10 On peut les préparer par compression directe ou en passant par une granulation au mouillé. Le mode opératoire par compression directe est préféré mais il peut ne pas convenir dans tous les cas selon les doses et les propriétés physiques du composant actif.

15

#### *A - Par compression directe*

	mg pour 1 comprimé
composant actif	10,0
cellulose microcristalline B.P.C.	89,5
20 stéarate de magnésium	<u>0,5</u>
	100,0

25 On passe le composant actif au travers d'un tamis à ouverture de maille de 250  $\mu$ m de côté, on mélange avec les excipients et on comprime à l'aide de poinçons de 6,0 mm. On peut préparer des comprimés présentant d'autres résistances mécaniques en modifiant le poids de compression avec utilisation de poinçons appropriés.

*B - Granulation au mouillé*

	mg pour un comprimé
composant actif	10,0
lactose Codex	74,5
5 amidon Codex	10,0
amidon de maïs pré-gélatinisé Codex	5,0
stéarate de magnésium	<u>0,5</u>
Poids à la compression	100,0

- 10 On fait passer le composant actif au travers d'un tamis à ouverture de maille de 250  $\mu$ m et on mélange avec le lactose, l'amidon et l'amidon pré-gélatinisé. On humidifie les poudres mélangées par de l'eau purifiée, on met à l'état de granulés, on sèche, on tamise et on mélange avec le stéarate de magnésium. Les granulés lubrifiés sont mis en comprimés comme pour les formules par
- 15 compression directe. On peut appliquer sur les comprimés une pellicule de revêtement au moyen de matières filmogènes appropriées, par exemple la méthylcellulose ou l'hydroxy-propyl-méthyl-cellulose, selon des techniques classiques. On peut également revêtir les comprimés de sucre.

20 Capsules

	mg pour une capsule
composant actif	10,0
*amidon 1500	89,5
25 stéarate de magnésium Codex	<u>0,5</u>
Poids de remplissage	100,0

\*une forme d'amidon directement compressible provenant de la firme Colorcon Ltd, Orpington, Kent, Royaume Uni.

30

On fait passer le composant actif au travers d'un tamis à ouverture de maille de 250  $\mu$ m et on mélange avec les autres substances. On introduit le mélange dans des capsules de gélatine dure n°2 sur une machine à remplir appropriée.

On peut préparer d'autres unités de dosage en modifiant le poids de remplissage et, lorsque c'est nécessaire, en changeant la dimension de la capsule.

### 5 Sirop

mg par dose de 5 ml

	composant actif	10,0
	saccharose Codex	2750,0
	glycérine Codex	500,0
10	tampon )	
	arôme )	
	colorant )	q.s.
	préservateur )	
	eau distillée	5,0

15

On dissout le composant actif, le tampon, l'arôme, le colorant et le préservateur dans une partie de l'eau et on ajoute la glycérine. On chauffe le restant de l'eau à 80°C et on y dissout le saccharose puis on refroidit. On combine les deux solutions, on règle le volume et on mélange. Le sirop obtenu est clarifié par filtration.

20

### Suppositoires

	Composant actif	10,0 mg
25	*Witepsol H15 complément à	1,0 g

\*Marque commercialisée pour Adeps Solidus de la Pharmacopée Européenne.

On prépare une suspension du composant actif dans le Witepsol H15 et on l'introduit dans une machine appropriée avec moules à suppositoires de 1 g.

30

Liquide pour administration par injection intraveineuse

		g/l
composant actif		2,0
eau pour injection Codex	complément à	1000,0

5

On peut ajouter du chlorure de sodium pour régler la tonicité de la solution et régler le pH à la stabilité maximale et/ou pour faciliter la dissolution du composant actif au moyen d'un acide ou d'un alcali dilué ou en ajoutant des sels tampons appropriés. On prépare la solution, on la clarifie et on

10 l'introduit dans des ampoules de dimension appropriée qu'on scelle par fusion du verre. On peut également stériliser le liquide pour injection par chauffage à l'autoclave selon l'un des cycles acceptables. On peut également stériliser la solution par filtration et introduire en ampoule stérile dans des conditions aseptiques. La solution peut être introduite dans les ampoules en

15 atmosphère gazeuse.

Cartouches pour inhalation

		g/cartouche
composant actif micronisé		1,0
20 lactose Codex		39,0

Le composant actif est micronisé dans un broyeur à énergie de fluide et mis à l'état de fines particules avant mélange avec du lactose pour comprimés dans un mélangeur à haute énergie. Le mélange pulvérulent est introduit en

25 capsules de gélatine dure n°3 sur une machine à encapsuler appropriée. Le contenu des cartouches est administré à l'aide d'un inhalateur à poudre.


Aérosol sous pression à valve doseuse

	mg/dose	pour 1 boîte
composant actif micronisé	0,500	120 mg
acide oléique Codex	0,050	12 mg
5 trichlorofluorométhane pour usage pharmaceutique	22,25	5,34 g
dichlorodifluorométhane pour usage pharmaceutique	60,90	14,62 g

- 10 Le composant actif est micronisé dans un broyeur à énergie de fluide et mis à l'état de fines particules. On mélange l'acide oléique avec le trichlorofluorométhane à une température de 10-15°C et on introduit dans la solution à l'aide d'un mélangeur à haut effet de cisaillement le médicament micronisé. La suspension est introduite en quantité mesurée dans des boîtes
- 15 aérosol en aluminium sur lesquelles on fixe des valves doseuses appropriées délivrant une dose de 85 mg de la suspension ; le dichlorodifluorométhane est introduit dans les boîtes par injection au travers des valves.

## REVENDICATIONS

### 1. Composés répondant à la formule générale (I)



dans laquelle

$R_1$  représente un hydrogène ou un alkyle linéaire ou ramifié comprenant de  
10 1 à 6 atomes de carbone,

$Z_2$  représente O, NH,  $\text{CH}_2\text{O}$  ou  $\text{CH}_2\text{NH}$ ,

$R_2$  et  $R_3$  identiques ou différents représentent un hydrogène ou un groupe  
choisi parmi un alkyle linéaire ou ramifié, un alcoxy, thioéther, nitrile,  
trifluorométhyle ou halogène (F, Cl, Br, I), ou,  $R_2$  et  $R_3$ , lorsqu'ils sont  
15 adjacents, pris ensemble, forment un cycle à 5 ou 6 chaînons de façon à  
constituer par exemple un naphthyle, un tétrahydronaphthyle, un benzopyrane  
ou un benzodioxane,

X-Y représente  $\text{NCH}_2$ ,  $\text{CH-CH}_2$ ,  $\text{C=CH}$ , N ou  $\text{NCH}_2\text{CH}_2$ ,

$Z_1$  représente  $-(\text{CH}_2)_n-$ ,  $-(\text{CH}_2)_n\text{CO-}$ ,  $-\text{CO-}$ ,  $-\text{CO}(\text{CH}_2)_n-$ ,  $-\text{SO}_2-$ ,  
20  $\text{SO}_2(\text{CH}_2)_n-$ ,  $-\text{O}(\text{CH}_2)_n-$ ,  $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{CO-}$ ,  $-\text{OCO-}$ ,  $-\text{NH}(\text{CH}_2)_n-$ ,  
 $\text{NH}(\text{CH}_2)_n\text{CO-}$ ,  $-\text{NHCO-}$ ,  $-\text{NHCO}(\text{CH}_2)_n-$ ,  $-\text{NH}(\text{CH}_2)_n\text{SO}_2-$ ,  $-\text{NHSO}_2-$ ,  
 $\text{NHSO}_2(\text{CH}_2)_n-$ ,  $-\text{CH=CHCO-}$ ,  $-\text{CCCO-}$ ,  $-(\text{CH}_2)_n\text{SO}_2-$ ,  $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{SO}_2-$ .

Dans le cas particulier où X-Y représente  $\text{CH-CH}_2$ ,  $Z_1$  peut également  
représenter -O-,

25  $-\text{NH-}$ ,  $-\text{CONH-}$ ,  $-\text{SO}_2\text{NH-}$ ,  $-\text{OCONH-}$ ,  $-\text{NHCOO-}$ ,  $-\text{NHCONH-}$ ,  $-(\text{CH}_2)_n\text{NH-}$ ,  
 $-(\text{CH}_2)_n\text{O-}$ ,  $-\text{CO}(\text{CH}_2)_n\text{NH-}$ ,  $-\text{NH}(\text{CH}_2)_n\text{O-}$ ,  $-\text{NH}(\text{CH}_2)_n\text{NH-}$ ,  $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{NH-}$ ,  
 $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{O-}$ ,  $-\text{CO}(\text{CH}_2)_n\text{O-}$ ,  $-\text{SO}_2(\text{CH}_2)_n\text{NH-}$ ,  $-\text{SO}_2(\text{CH}_2)_n\text{O-}$ ,  
 $-(\text{CH}_2)_n\text{SO}_2\text{NH-}$ ,  $-(\text{CH}_2)_n\text{CONH-}$ ,  $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{SO}_2\text{NH-}$ ,  $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{CONH-}$ ,  
 $\text{NH}(\text{CH}_2)_n\text{SO}_2\text{NH-}$ ,  $-\text{NH}(\text{CH}_2)_n\text{CONH-}$ ,  $-\text{NHCO}(\text{CH}_2)_n\text{NH-}$ ,


$\text{NHSO}_2(\text{CH}_2)_n\text{NH-}$  dans lesquels  $n$  représente un nombre entier compris entre 1 et 6,

Dans le cas particulier où  $\text{X-Y}$  représente  $\text{CH-CH}_2$  ou  $\text{C=CH}$ ,  $\text{Z}_1$  peut également représenter  $-\text{CH=CH-}$ ,  $-\text{CC-}$ ,

- 5  $\text{Ar}_1$  représente un reste aromatique (phényl, naphtyl ou pyridyl) pouvant être diversement substitué par exemple par un ou plusieurs groupes choisis parmi un alkyle linéaire ou ramifié comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, un trifluorométhyle, un trifluorométhoxy, un 2,2,2-trifluoroéthyle, un phényle, un benzyle, un cycloalkyle comprenant de 3 à 7 atomes de carbone, un
- 10 hydroxyle, un thiol, un alcoxy ( $\text{OR}_4$ ), thioéther ( $\text{SR}_4$ ), un nitro ( $\text{NO}_2$ ), un nitrile ( $\text{CN}$ ), une amine ( $\text{NH}_2$  ou  $\text{NR}_4\text{R}'_4$ ), un dérivé d'amine ( $\text{NHCOR}_4$ ,  $\text{NHSO}_2\text{R}_4$ ,  $\text{NHCONR}_4\text{R}'_4$ ,  $\text{NHCO}_2\text{R}_4$ ,  $\text{NHSO}_2\text{NR}_4\text{R}'_4$ ), un halogène (fluor, chlore, brome ou iode), un carbonyle ( $\text{COH}$ ,  $\text{COR}_4$ ,  $\text{COOR}_4$ ,  $\text{CONR}_4\text{R}'_4$ ) ou un hétérocycle pouvant éventuellement être substitué tel qu'un hétérocycle à
- 15 5 membres pouvant contenir de 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi l'oxygène, le soufre ou l'azote ou par deux substituants sur des carbones voisins pouvant former un cycle avec le reste aromatique auquel ils sont attachés, ou encore, le reste  $\text{Ar-Z}_1$  représente un tétrahydronaphtyle dont la liaison avec  $\text{X}$  met en oeuvre un carbone saturé,
- 20  $\text{R}_4$  représente un reste alkyle, linéaire ou ramifié, comprenant de 1 à 6 atomes de carbone,  $\text{R}'_4$  représente un hydrogène ou un reste alkyle, linéaire ou ramifié, comprenant de 1 à 6 atomes de carbone et leurs sels, hydrates, solvates et bioprécurseurs physiologiquement acceptables pour l'usage thérapeutique, les composés de formule générale
- 25 (I) se présentant sous forme isomères géométriques et optiques ainsi que sous forme racémique.

2. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce qu'ils correspondent à la formule générale la :





dans laquelle  $Ar_1$ ,  $Z_1$ ,  $X-Y$ ,  $Z_2$  et  $R_1$  sont définis comme dans la revendication 1 et  $R_2$  représente un hydrogène, un méthyle, un méthoxy ou un chlore.

3. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que  $Z_2$  représente O ou NH.

10 4. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que  $Z_2$  représente  $CH_2O$  ou  $CH_2NH$ .

5. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que  $X-Y$  représente  $N-CH_2$ .

6. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que  $X-Y$  représente  $CH-CH_2$  ou  $C=CH$ .


20 7. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que  $Z_1$  représente  $(CH_2)_n$ ,  $CO(CH_2)_n$ ,  $SO_2(CH_2)_n$ ,  $O(CH_2)_n$ ,  $NH(CH_2)_n$  ou  $NHCO(CH_2)_n$ .

8. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que  $Z_1$  représente  $(CH_2)_nCO$ ,  $CO$ ,  $O(CH_2)_nCO$ ,  $NH(CH_2)_nCO$  ou  $CH=CHCO$ .


25 9. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que  $Z_1$  représente  $SO_2$ ,  $(CH_2)_nSO_2$ ,  $O(CH_2)_nSO_2$  ou  $NH(CH_2)_nSO_2$ .

10. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que X-Y représente CH-CH<sub>2</sub> et Z<sub>1</sub> représente O, NH, CONH, SO<sub>2</sub>NH, OCONH, NHCOO, NHCONH, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>O, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>O, O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH, NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH, CO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NH ou CO(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>O.

11. Procédé de préparation des composés de formule (I) dans laquelle Ar<sub>1</sub>, Z<sub>1</sub>, X-Y, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> sont définis comme précédemment et Z<sub>2</sub> représente CH<sub>2</sub>O ou CH<sub>2</sub>NH caractérisé en ce que l'on condense un intermédiaire de formule (II)




dans laquelle Ar<sub>1</sub>, Z<sub>1</sub> et X-Y sont définis comme précédemment et Y' représente un groupe partant tel qu'un halogène (chlore ou brome), un tosylate, un mésylate ou un triflate, avec une aryl pipérazine de formule générale III




dans laquelle X' représente O ou NH, et R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> ou R<sub>3</sub> sont définis comme précédemment en présence d'une base organique ou inorganique.

12. Procédé de préparation des composés de formule (I) dans lesquels Ar<sub>1</sub>, Z<sub>1</sub>, X-Y sont définis comme précédemment et Z<sub>2</sub> représente O ou NH caractérisé en ce que l'on condense un intermédiaire de formule (III) défini comme dans la revendication 11, et une aryl pipérazine de formule (IV)




dans laquelle  $\text{Ar}_1$ ,  $\text{Z}_1$  et  $\text{X-Y}$  sont définis comme précédemment avec un électrophile de formule (XII)




dans laquelle  $\text{X}_1$  et  $\text{X}_2$  représentent un groupe partant tel qu'un halogène (en particulier le chlore), un groupe o-alkyle (en particulier le groupe  $\text{OCCl}_3$ ), un succinimyle, phtalyle ou imidiazolyle.

13. Procédé de préparation des composés de formule (I) dans laquelle  $\text{X}$  représente un azote, caractérisé en ce que l'on condense un intermédiaire de formule (XXXI)



dans laquelle  $\text{R}_1$ ,  $\text{R}_2$ ,  $\text{R}_3$  et  $\text{Z}_2$  sont définis comme précédemment et  $\text{X-Y}$  représente  $\text{N}$ ,  $\text{N-CH}_2$  ou  $\text{NCH}_2\text{CH}_2$  avec un électrophile de formule (XVII)



dans laquelle  $\text{Ar}_1$  et  $\text{Z}_1$  sont définis comme précédemment et  $\text{L}$  représente un groupe partant dont le choix ainsi que le choix des conditions expérimentales (pour réaliser la condensation) dépendront de la nature de  $\text{Z}_1$ .

14. Procédé de préparation des produits de formule (I) dans laquelle  $Ar_1$ , X-Y,  $Z_1$ ,  $Z_2$  sont définis comme précédemment et  $R_1$  représente un hydrogène caractérisé en ce que l'on hydrolyse en milieu acide un composé de formule (I) dans lequel  $R_1$  représente un t-butoxycarbonyle.
- 5 15. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédients actifs, un composé selon l'une des revendications 1 à 10, en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable comme médicaments.
- 10 16. Compositions pharmaceutiques contenant, à titre d'ingrédients actifs, un composé selon l'une des revendications 1 à 10, en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement tant curatif que préventif de la dépression et des désordres ou troubles compulsifs obsessionnels.
- 15 17. Compositions pharmaceutiques contenant, à titre d'ingrédients actifs, un composé selon l'une des revendications 1 à 10, en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement tant curatif que préventif de l'anxiété et des attaques de panique, de la schizophrénie, de l'agressivité, de la boulimie, de l'alcoolisme, de la douleur et des
- 20 maladies neurodégénératives comme les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer.
- 25 18. Compositions pharmaceutiques contenant, à titre d'ingrédients actifs, un composé selon l'une des revendications 1 à 10, en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement tant curatif que préventif des cancers.
- 30 19. Compositions pharmaceutiques selon l'une des revendications 13 à 16, caractérisées en ce qu'elles contiennent, en outre, au moins un second principe actif associé, doté de propriétés antidépressives, en particulier, le MILNACIPRAN et/ou un antagoniste 5HT 1A.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL  
de la  
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

2744449  
N° d'enregistrement  
national

FA 525380  
FR 9601273

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	WO-A-96 02525 (PIERRE FABRE MEDICAMENT) * le document en entier *	1-19
A	EP-A-0 524 146 (CIBA-GEIGY AG) * page 25 - page 29; revendications *	1-19
A	EP-A-0 606 824 (CIBA-GEIGY AG) * page 21 - page 26; revendications *	1-19
D,A	EP-A-0 533 266 (GLAXO GROUP LIMITED) * page 36 - page 42; revendications *	1-19
D,A	EP-A-0 533 267 (GLAXO GROUP LIMITED) * page 31 - page 35; revendications *	1-19
D,A	EP-A-0 533 268 (GLAXO GROUP LIMITED) * page 33 - page 38; revendications *	1-19
D,A	GB-A-2 273 930 (GLAXO GROUP LIMITED) * page 43 - page 47; revendications *	1-19
D,A	WO-A-94 15920 (GLAXO GROUP LIMITED) * page 37 - page 44; revendications *	1-19
D,A	WO-A-95 04729 (SMITH KLINE BEECHAM) * page 25 - page 28; revendications *	1-19
A	WO-A-95 06044 (SMITH KLINE BEECHAM) * page 16 - page 20; revendications *	1-19
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		C07D
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
7 Octobre 1996		Luyten, H
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul  Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie  A : pertinent à l'encontre d'un moins une revendication ou arrière-plan technologique général  O : divulgation non-écrite  P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention  E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.  D : cité dans la demande  L : cité pour d'autres raisons  &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>		

EPO FORM 1500 (04/81) (P04C13)

This Page Blank (uspto)